

全  
幼  
心  
鑑

全初心鑑卷之二

脉法

脉者血之府也長則氣滯短則氣病數則心煩大則病進即見  
水鏡先生曰小兒雖受陰陽二氣成其形壯氣尚未固何言有  
脉直至嬰兒似盡陰陽氣入乃可看脉其髮亂之年方生陰陽  
二氣

聖人云男七歲曰鬋生其元陽之氣女八歲曰鬋其陰陽方成  
故未滿鬋之年呼爲純陽若鬋齒滿後呼爲童兒始可看脉  
如身體俱感脉旺一息六至爲常人之脉一息八至爲熱九至  
風亢至虛四至損二至脫一至於死十至必是疳積虛損形容瘦  
劣若或身肥血色青白一息十一二至謂之虛是極病死是驚

脈亂若一息一二至者爲脈不來其人當冷必死遲若一息十  
二至者必死速不滿二日何名爲一息一呼一吸名爲一息呼  
吸者卽是出一氣入一氣謂之一息其脈若沉下來硬隱指急  
大者是有積者來微細卽是冷者虛軟微卽是熱時復一大卽  
是驚若大小不勻卽是惡候也先生所論浮數爲熱伏結爲寒  
沉細爲冷大小不勻爲惡候也數者緊也浮者輕也伏者貼也  
重手方見結者亂者沉者重沒謂之沉細有微也大小不勻則  
是或大或小而不勻是謂氣不生其人必死也

脉宗

經云胡於寸口人迎以處百病而決死生也寸口人迎陰陽之  
氣通於朝五時時據本氣十二其始從中焦注手太陰此是氣足

位寅時陽明經時陽明注是陽明長時太陰也時太陰注手少陰也是八迎之節午時太陽未時太陽注足太陽也時少陰未時少陰注手心主亥時少陽亥時少陽注足少陽子時厥陰丑時厥陰復還注手太陰又云寸口者脈之大會手太陰之脈動也此寸口所指右手寸口也脈氣所發脈也脈會入淵太淵名上經繫要都會之所手太陰脈所動之處

若朝於寸口人迎是朝於左手手少陰心經之位非右手氣口手太陰肺經之位若寸口人迎陰陽之氣通於朝是早朝朝於左手人迎手少陰心經之位非右手氣口手太陰肺經之位人迎手少陰心經乃午時朝會也即不是寅時朝會也

楊氏曰手心主心包絡脈手少陽三焦脈也故合於左手上部



足太陰脾脈也足陽明胃脈也故合爲右手中部此經作如此  
分別若依脈經配三部又與此不同也夫此法楊氏不能明其  
理故言不同也是師將三部以別配合五行六氣而言之師謂  
此寸尺反到入關三部各何所主說云上部法天主胸以上至  
頭之有疾中部法人主膈下至臍之有疾下部法地主臍以下  
至足之有疾故言審而次之者也

經云脈有三部七關八三部位部有四經各部之內各有二經六部之內  
合爲十二經今止云四經者是謂寸太陽陽明與足少陽少陰此二經法水火之  
性各有綱紀而不能變通上下餘八經在手生足在足生手所以經言部有  
四經也 手有太陰肺陽明大腸經足有太陽膀胱少陰腎爲上  
下部肺爲部腎爲下部 何謂也然手太陰陽明金也二經屬肺

與太陽爲金是少陰太陽水也二經是腎與膀胱爲金 金生水肺  
金在上而下生下腎水 水流下行而不 肺上故在下部水與腎不  
下水之性流下行不能逆上故在下部足一厥陰少陽水也二經是肝  
與膽屬木 生手太陽少陰火 二經是心與小腸屬火肺不能生火矣  
上行而不能下故在上部火性炎上不能下生足而生手心主少陽  
火是生右尺相火故在上部 手心主少陽火心爲君火爲相火二經  
是心包絡三焦 生足太陰陽明土 二經是脾與胃屬土相火能生  
土主中宮故在中部此皆五行子母更相生養者也右寸金生  
左尺水水生左關木木能生左寸君火君火生右尺相火相火生右關  
土故曰子母相生

脉證

論曰文藻雖雅義理難尋動靜之辨有傳有約博則二十字不

濫絲毫約則示沉澁數納括網紀

浮為風為虛 沉為濕為實 遲為寒為冷 數為熱為燥

脈亂不治 氣不和弦急 傷食沉緩 虛驚促急

### 三脉五脉直說

凡看小兒初生至半晬之間有病即與看額前眉上髮際之下以名中食二指輕手滿曲按之兒頭在左摩右手在右舉左手食指為上中指為中名指為下若三指俱熱感受風寒邪鼻塞氣鬱發熱二指俱冷感受風寒勝寒吐瀉若食中指熱上熱下冷若名中指熱夾驚之候若食指熱胎隔不和氣滿若名指熱

乳食不消。

半臂已上方可看虎口。周臂已上者虎口無一指脉者五百七十四日變業滿足。尺與看一指脉以食指家轉分取三部。凡言三部者非寸關尺係小兒三部。回看氣色爲一。經虎口脉紋爲二部。寸口一指脉爲三部。凡脉者上按頭前下診大衝并前三部謂之五脉。凡兒有患不屬惡候即不可與診大衝脉其脉定生死之要。當診之不可看惡汚人情傷於不仕用矣。

### 分三部法

分三部但取掌後高骨爲關。關前爲寸口。關後爲尺澤。如診小兒脉可以一指按其三關進退取之。此法甚明不須疑惑也。

定喘急法

欲看候先須自審已知氣息然後審病人之氣息人一呼一吸名曰一息醫士自患不可與人診候

定舉按法

診脉輕按得之者肺也重按得之者臟也不輕不重得之者胃氣也

論小兒脉

小兒脉三歲以上五歲已下然後可看候與大人有異者為等吸至八是常也九至病十至困蓋小兒純陽故脉息數候如大人者為不同也小兒周歲以前脉皆急難過周歲已後方有脉形寶鑑云五百七十六日乃成人無脈骨肉堅牢方可診候也

訣脉主病

緩小腸鳴滿 沉微乳不消 數浮驚熱作 弦緊痛來潮

脾脉微細不吐則瀉難治陽數或消主吐乳又主瀉不爾  
即熱易治實鑑云臟腑不利見浮於關上也

沉數熱加寒 微浮救不安 澁微多瘀血 浮實大便難

訣脉逆順

七表八裏脉乃是五臟六腑脉也蓋小兒純陽有病多見七表  
脉爲屬陽脉故也主病有驗八裏脉所以不見者爲屬陰脉故  
也設是小兒有八裏脉者必發陰痼孫氏云陽脉急甚必變陽  
痼急驚風也陰脉沉遲多變陰痼是慢驚風也是以八裏脉多  
不經見

傷寒脉大最相宜 腫滿浮洪病可醫 微細心疼終是順  
沉遲吐瀉必須危 蟲攻緊滑皆知吉 渴飲沉微勢已衰  
驚搐浮洪多易治 喘急遲盛滑為奇

三部脉

浮按之不足舉之有餘動餘皮膚 洪按之極大

弦按壯如弓弦

數者吸之中七八息至

此四者屬陽為實熱病主腑主表

微按之若有若無

沉細最不得重手乃得

弱無按者無壯無綿

緩一呼一吸二至曰緩

此四者屬陰為虛冷病主臟主裏

湯氏曰二歲已下十五已上謂之童孩宜以肝診之小兒八至

爲平九至乃死尋常指下診之只多大人一至爲平若八九至  
乃是數脈必發驚悸醫士詳之

臟腑定位

左心小腸肝膽腎 右肺大腸脾胃命 腎家之府是膀胱  
命脈外診三焦病

五臟平脈

浮大而散心之常 肝脈來弦細又長 肺脈短浮脾緩大  
沉濡而滑腎家鄉

汗下溫脈

大凡溫藥脈沉遲 浮緊須知汗可施 脈若來長兼脈實  
此爲可下不須疑



脾胃有脉

尺中弱甚似無根 脾胃于今脉上存 六腑失養猶進食  
斯人終不到泉門

陰陽脉證逆順

證屬於陽陰陽形 仙丹妙劑少安平 若遇厥後關陰證  
陽脉回時却入生

小兒脉總歌

嬰兒有疾未能言 額有肌膚尚少堅 脉理未全難考據  
當觀形色定由緣 面帶青色肝之疾 赤色心病因可必  
白為肺病黃屬脾 黑已屬腎斯危得 黑死還輕死可生  
紅深時氣有積傳 赤至已受脾風了 青黑應傳入慢驚

發熱必冷是瘡疹 耳冷應知熱證 通身皆熱是傷寒

上熱下冷飢食病 更將虎口結氣看 或紅或紫傷風寒

青驚白疳黑中惡 黃因脾端皆可觀 紋直是驚則傷損

沉隱為風因可識 曲外為冷內食傷 紋得短少當安逸

五臟部位怕相承 更看胃受有虧盈 陰陽表裏不可亂

補過滿多須辯名 五百七十有六日 大小變蒸數已畢

血榮氣盛脉理全 診後方能無所失 男左女右不相干

須臾一指蓋三關 浮風洪熱驚煩數 遲冷沉虛實積然

脉浮因知感風候 浮大傷寒宜審究 浮緊驚風不可當

浮數風熱應須有 浮遲之脉有潮熱 乃是胃寒無所守

浮虛盜汗糖中多 浮洪胃口如火炙 瀉利浮大不可醫

口噤不食亦堪悲

脉洪脹痛多嘔逆

定知蟲動不容違

脉弦爲風或爲寒

弦數之脉瘥未痊

弦急因知爲客忤

氣或不和邪所干

脉沉帶緊爲腹痛

緊數爲驚多痰痰

脉牢而實大便難

牢緊癰聚何能動

脉浮沉濡爲虛弱

久亦變經上還作

虛緊伏熱致生風

虛濡慢驚且可追

脉沉而實爲有積

沉數骨間須極熱

沉遲虛冷豈應無

沉緩食傷多嘔逆

脉緩筋細皆爲冷

若食不化咽相宜

單細疳勞伏氣攻

大小不均惡候省

變蒸寸脉多不拘

既曰變蒸何心驚

脉如雀啄風癰候

直上直下亦驚名

又

二三歲時看虎口

更加中指按骨

浮即風生數即驚

緊是癰癰風作熱

沉細脈痛緩沉虛

瀉利皆出此脈初

微邊有積兼蟲盛

遲濇元來胃腕迂

四歲脈不在指端

一指高骨按虛實

五六袞轉尋三部

平正關上為準則

七八稍移指少許

九十次第分位取

十一十二也同者

十四十五三指數

小兒有病脈不多

先定浮陽沉陰遲冷

數變難數音所

沉遲為陰浮為陽

更有向部屬何妨

青色驚風白虛瀉

赤生痰熱黑難當

黃是脾家泄有積

醫士審度用良方

小兒五歲一指診

十歲方將兩指看

十四五方三指定

更量長短旋推端

十六人迎以候外

右手氣口以候內

外候風痰暑濕并

內則乳食痰積害

其餘一一依前法

更不於此重引載

孩兒五歲至七歲 五歲脉中方見指 兩畔肉中子細看

男左女右專心記 左主脾肺心腎肝 右主熱生驚癇氣

女孩反此背看之 更察病源全在智 若脉來時洪大急

此是傷寒須臾執 洪大却慢是傷脾有積 淫細脾虛因取

積脾胃虛弱 脉小急來腎氣虛脉小急者乃是數至驚風候

積在小腸瀉藥方醫在小腸今小使瀉成泄氣 診脉若來一兩動

此名心死癰難瘥 及人回指急如弓 弦急死候

脾疾死候君莫怪 脉弦急脾風死候

### 二關六脉生死歌

小兒有證須憑脉 一指二關定有息 須知風熱脉浮洪

緊數驚風四肢掣

緊促之時瘰癧疔

浮緩

洪緊無汗是傷寒

腎士不辯誠無識

人迎

氣口緊盛傷於食

分明妙訣請君知

二至

五至為虛四至病

六至平和曰無病

七至

九至十至病勢極

十一十二死無疑

此訣

脉治直訣

小兒有病須憑脉

一指三關定有息

浮洪

虛冷沉遲實有積

熱盛之脉須與解

風盛之脉須與利

斜利

傷冷之脉須與溫

積聚之脉下為最

小兒三歲至五歲

呼吸須將八至看

九至

短長大小有邪干

小兒脈緊是風癰

沉滑須知乳食難

腹痛緊弦實秘

沉而數者骨中寒

胸陷唇枯目直視

口中冷氣臥如癡

身形強直手足冷

掌冷頭低盡真醫

小兒脈大多風熱

沉細元因乳食結

弦最多是肝膈風

緊數驚風四肢掣

洪浮胃口似火燒

沉緊腹中痛不飲

虛濡有氣又垂驚

脈乳大小便中血

四五洪來若瀕滿

沉細腹中痛切切

滑中露濕冷所傷

弦急客忤分明說

小兒乳後多嘔逆

更兼脈亂無憂慮

弦緊之時被氣纏

脈緩即是不消乳

緊數細快亦少苦

虛濡驚風邪氣助

痢下言腸結痛時 浮大之脈歸泉路

小兒脈緊風癰候 沉緩食傷多吐逆

緩急虛驚神不守 冷則沉細風則浮

腹痛之候緊而弦 此是胃寒宜療救

不治自然無過謬 單細瘠勞洪有蟲

脈伏而遲有寒熱 此是胃家多作嘔

子細斟量口審究

太衝尺脈

寸關無脈已昏沉 脚面猶着尺脈存

尚餘生意在其根

太衝陽脈

弦緊因知邪不和

生實大便應秘久

變蒸之時脈亦變

大小不勻受惡候

瀉痢浮大不可醫

此理恰如枝葉悴



太衝穴在兩足大指本節後一寸陷中動脈陰之所注診此者可決男子之死生或足內踝後跟骨上動脈陷中

### 七表脈

浮按不足舉有餘 扎脈中空兩畔居  
實形偏幅與長俱 弦如始按弓弦壯  
洪舉按之皆極大 此為七表不同途

### 八裏脈

微來如有又如無 沉舉都無按有餘  
濡來散止細仍虛 伏須切骨沉和類  
澀脈如刀輕刮竹 分明八裏即如途

脈是 六一寸半足  
診太谿部門外穴在

滑體如珠中有力  
徐若牽繩輕索初

弦緩見關二度至  
軟弱而沉指下圖

七表受病

浮爲中風乳失血

滑吐實下分明別

弦爲拘急緊爲瘕

洪脈元中偏七熱

八裏受病

遲寒緩結微爲痞

澀則血滯沉氣滯

伏爲物裏濡氣虛

弱則筋萎須審記

聽聲驗病訣

樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變蓋人病蘊於臟內聲音必形於外樂聲亂則五音不和人聲亂則五臟不和所以聽聲音驗人之疾病也

素問云視喘息聽聲音而知所苦是故周官云以五氣五色五聲視以死生

孫真人曰五臟不和五聲不順五色不定必主病也

三因曰觀五臟有餘不足候之於聲聲臟音中之守也中盛則氣盛中衰則氣弱故聲如從中言者氣之虛也言微終日乃後言者氣之奪也謔妄不避善惡謂明之亂也鄭聲音意不相續陰陽失守也故曰得守者生失守者死

驗五臟正聲

脾屬土應宮音

肺屬金應商音

肝屬木應角音

心屬火應徵音

腎屬水應羽音

亂聲音主病

聲雄而重大

聲雌而實澁

聲悲而微

聲濁而沉重

聲哭而不啼

聲啼而不哭

聲促而燥急

聲長而細小

聲嘆而不響

聲嘆而軟顫

聲短而微細

聲短而遲緩

聲前促而後緩

聲啞煎不定

聽聲驗病

肝應角其聲悲而和雅

心應徵其聲雄而清明

脾應宮其聲慢而緩大

肺應商其聲促而清冷

腎應羽其聲沉而細長

聲悲是肝病 二聲呼聲雄是心病 三聲笑聲慢是脾病 四聲哭

聲促是肺病 五聲哭聲沉是腎病 六聲呻

已上驗臟病

聲清是膽病

聲短是小腸病

聲速是胃病

聲長是大腸病

聲微是膀胱病

已上驗腑病

聲悲慢是肝脾相剋病

聲速微細是胃膀胱相剋病

聲細長是腎聲輕是虛

聲沉重是風

聲細短是氣

聲重是熱

聲短遲是瀉

聲長細是痢

聲實是秘澀

重實聲

重實聲雄軀熱為

二焦氣壅在心脾

傷風咳嗽咽喉痛

結滯腸中糞出邊

悲焦聲

聲悲焦有燥 恐怖欲生風 重濁聲沉靜 疳攻必耳聾

哭啼聲

但哭無啼只是驚 多啼不哭痛分明 驚輕顛嘔風瀉病

速緩聲類吐瀉成

驚則聲

驚前煩燥睡難安 躁促聲言為感寒 語短氣微尿上澀

長澤聲細利多般

遲緩聲

語短聲遲緩 腸鳴泄瀉頻 嘔聲多不響 風熱肺家因

小兒聲嘶少嗽眼目澁者是欲出瘰癧有瘰癧盛出或出後瘰癧咽喉聲啞者死候也有初生兒患重舌喘聲不出者死

### 初生將護法

小兒初生出胎便以綿裹拭口中及舌上青泥惡血若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣

小兒初生落地不作聲者取冷水灌之須臾當自啼及以葱白細鞭之即啼

### 初生回氣法

小兒初生氣欲絕者必因難產或胃寒冷所致不可便斷臍帶急烘綿絮包抱懷中以胎衣置火中燒用大紙捻點清油燒於臍帶上往來燎之使暖氣入腹須臾氣回方洗

# 拭口法

小兒在胎口有穢惡生下啼聲不出急用新軟綿布指拭去口中惡汁免便嚥下嚥下則爲口日痘瘡不可不知若伏之在於心遇人行時氣久熱不除熱乘於心心主血則出痘伏之在胃而胃主肌肉發出外則出痘瘡伏之在脾則出痘瘡伏之在肺則出膿泡感胃風寒其毒當出也之小兒口不能受此者或幼年不食年至四五十歲亦無可兒古人仍用黃連甘草法猪乳法米麥法牛黃法蓋前人未當講究點入口中以解毒能用此法則終身無瘡痘之患

小兒生下不能啼 惡物咽中者去之 軟綿布須楷拭口  
好將朱蜜煎凝 勿令他日爲瘡毒 兒使集心熱透肌



活法定用須講究 從來此理少人知

甘草法

妊婦臨月預辦甘草細切必許產時濃煎沸湯泡盡肉盡定收生之際急以新軟綿帛蘸甘草汁拭其口搨與喫次用黃連

黃連法

產婦臨月用黃連細切提碎綿裹百沸湯同甘草一椀泡如煎法拭口次用朱蜜

朱蜜法

錢氏曰用好朱砂二大錢細研水飛煉好白蜜一塊殼不結稠和成膏每用一小豆大乳汁化服時時滴口中二日內止進三

粒又按

葛氏肘後方云先用甘草黃連法口吐其惡汁稍定更與米  
蜜安神定魄用朱砂一大豆粒研細以蜜一蜺殼和朱砂旋  
沫口中非獨鎮心安神亦能解惡物之毒一生免痘瘡之患

牛黃法

錢氏日用真牛黃一小豆大塊用如蜜搜和成膏每服一小豆  
大乳汁化服時時漱口形色不安者服之其效如神或身熱  
黃白痘服

千金方云牛黃益肝膽除熱定精神止驚風利辟惡氣治百病

猪乳法

聖惠方云取猪乳須令猪兒飲母次便捉猪兒後脚起口自離

乳意用手將之即得乳矣非此法不可取也

張煥論云初生兒或未有奶子產婦之乳未下可用猪乳代之可免驚癇疳瘡

錢氏曰初生小兒至滿月內可當取猪乳哺口中最佳

### 初生浴法

小兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍瘡等證用清油調髮灰傳臍洗兒不可用水打濕臍帶千金論曰浴兒當調和湯看公熱若不得所令兒水驚即成疾病冬寒不可久浴則傷風寒夏不可久浴則傷熱水溫不灼浴時當護兒背須風邪自此而入使之發熱成癰

小兒生下可先浴後斷臍切不可使令錢氏預致剪刀於懷中

令煖以軟絹裹臍然後斷之蓋臍不可令長又不可太短只取  
兒足掌長如長則不乾引外風則成臍風之患則臍內痛而  
青啼叫不已浴水煮以金銀丹砂虎頭骨則除熱驚客忤夢以  
銅鐵器則辟惡氣煮以桃柳李根黃連指躡下疳不生丹毒  
黃以麥門冬丁荊芥鉛錫則安心氣覺日暮欲生頭以甘草浸  
水一宿銀銚熬水成膏入丹砂末合和以金箔則去熱瘰癧  
毒物如斯法預防諸疾患禍不作自無憂矣

浴兒湯熟添少許清漿水一起攪浴則清涼無熱兒既不畏  
風又引散諸熱夏中盛暑時乳母浴後不可與乳嬰兒能  
令成胃毒秋成亦白痢浴後可令安息良久熱散乳之即可患  
初生兒浴用豬膽一枚投入湯中周旋之前可免瘡疥浴時調

和湯看冷熱若或冷或熱令兒驚動服藥也者宜用五根湯除惡氣不驚惡毒之患浴以以上不祥

小兒莫抱於簷下濕流膏風寒及逆轉傳之則驢馬之時各異日之親諸兒物並不可與兒切宜忌之

浴兒之法要相當 其遺類無不弄水藥 冬令恐風吹背背

夏涼因熱入於筋 將猪脂一 傾於水 兒生三日浴之亦可去不祥

桃李拔湯洗更良 千金方云行 膽汁傾於水中可生瘡三日後桃李楊

煎湯浴可辟不祥不生瘡 免使後來生瘡疥

孩兒從此日安康

洗浴吉日

寅卯酉日吉

壬午丁未

壬申丁巳癸巳凶

五稜湯

枇杷

椰

梅

桑根

楓

右每味一兩洗淨切碎用水煮溫洗浴後用鮮粉撲身上  
只用五般藥亦好枝亦好凡浴護兒年小風邪白此而入  
用益母草剉碎一升煎令十沸溫浴不生瘡毒

瘰癧證

小兒瘰癧者乃生下浴之遲也作病四肢寒慄多啼若是啼聲  
不生面臉青紫舌上白胎若胸乾喘不下手足時搐皆死候  
產後難致病端 浴遲瘰癧胃經寒 四肢寒慄時無啼  
臉額青黃證可觀 手足瘳拘如異候 唇牙闌禁未能安

消除腦髓諸邪毒 用保康寧亦不難

### 髮際穴

小兒初誕收生者多於頭額前髮際中間灸之至血脈其可以截風路也諸風驚證藥力不及昏迷沉瀉嘿然無醒於此灼艾每有扶危之功然亦顧其善後之劑何如國百會一穴在頂心端正旋毛間亦濟危困者以是哉

### 新生兒戒灸

愚嘗戒之有北人居於南方新生兒多與灸然其害非淺古云河洛上地多寒兒生三日灸顙以防驚者東南地土多溫新生芽兒無病不宜逆灸

濟經云前世之書執小兒氣盛之驗者不知陽中有陰而

應吐利執河北關中地寒之論者不知南北之異而專於冬燠  
大抵繁地土寒濕燠

### 斷臍法

千金論曰凡斷臍切不可刀割咬斷後纏結所令臍帶令至兒  
足趺上短則中寒令兒肚中不調或成內癰若先解臍然後浴  
者水入臍中則令腹痛其臍斷訖連臍帶中多有蟲者宜急剔  
撥去不然則入腹成疾大抵嬰兒初生斷臍之後宜用熟艾厚  
裹愛護若乳母不詳或因洗浴水入臍中或遺棄在襁抱之內  
濕氣傷於臍中或可解脫為風冷邪氣所侵皆能令兒臍腫多  
啼不能乳實即成臍風也

錢氏曰初生兒若洗訖斷臍帶須臍單衣咬斷將暖氣呵七遍



新脬當重六寸長則傷肌短則傷臟中寒或成內虧急則去脬  
帶中穢氣免令入腹成疾又按汁不盡暖氣少寒氣後則成脬  
風

弄兒生下合應爲須臾單衣咬新脬短則入緣傷臟腑  
長因臆是損膚肌無令水入偏爲妙其使風傷恐致疑  
但用新綿纏縛定免教孩子受災危

### 裹脬法

千金論曰裹脬須令白練柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等  
今之緩急得中急則令兒吐乳兒生二十日乃解脬視之或燥  
則其腹熱啼時當解之易衣并裹解脬須閉戶下帳冬間用火  
令暖夏溫暖

錢氏曰斷臍後襁褓記看見形色若面紅目赤赤皮發熱快食者用米粉半錢令兒吮之有臍囊下最佳

臍風證

聖惠曰斷臍為水濕之氣流於心包絡

湯氏曰或襁褓尿濕之所侵或當風解脫風邪所襲能令臍炎腫爛四肢柔直多啼不乳先撮口而生瘻若臍遠青黑撮口不開是為內搐不治瓜甲黑青即死

王氏曰或熱在臍堂伸引努氣亦小臍腫常服龍膽湯

千金論曰小兒始生其氣尚盛若有疾病即煩之若不時下則成別證

小兒生下有臍風證者多因斷臍帶後為風濕所傷而成也風

入臍者今臍腫脹臍口撮多啼不能乳食謂之臍風若入經絡  
多變為疳積疳積證治之 紫園子熱感四順歌

宜風散 治初生兒因斷臍後外傷風濕厥青口撮多啼不乳  
口出白沫

全蝎 二箇頭尾全去毒用無灰酒不許塗炙為末

麝香 一小字剉研

右為研極細末用半字金銀煎湯或麥門冬去心煎湯調化  
食遠服

防風散 治初生兒臍風

防風去蘆 羌活 黃芩

當歸 川白芷 甘草半錢

右爲極細末少許用燈新麥門冬去心洗淨化不拘年使

撮口證

湯氏曰初生一臘乃免一日也

巢氏曰胎受風熱入臍流毒心脾之經或成諸風胎風鎖口驚  
腸卵油等證皆令氣促舌強撮口如囊不乳

其證面目黃赤撮口不乳治宜疎利

千金論曰小兒初出胎骨肉未斂肌肉猶是血也血凝且堅方  
成肌膚其血沮敗不成肌肉致令面目皆黃閉目口撮皆是血  
脈不斂也

聖惠論曰小兒撮口者皆由在母胎中感於風熱兒生之後氣

血未調洗浴當風而成疾若口吐白沫四肢覺冷必難用藥也  
小兒患諸風疾傳入惡候至於撮口病致危急凡有諸門撮口  
胎風撮口鎖肚撮口癰腸撮口外疳撮口應病悉入成風風入  
心脾俱能撮口夫患在撮口者皆由結鬱于中于及腸胃閉不  
得通氣不能化腹中滿脹肚下青筋撮口不乳證候甚急若不  
速與利下無因救療醫士若將撮口以為常則候傳入豈可授  
藥應患用紫圓子利之緩通疾去氣和曰和用者敬信而已  
龍膽湯 治嬰孩小兒胎驚月內氣盛發熱驚風撮口壯熱

龍膽草

釣藤

柴胡上炭

黃芩炒

桔梗去蘆炒

赤芍藥炒

茯苓去皮

甘草炙各五錢

蜣螂二枚去翅足炙

大黃一分紙裹煨

右合研為極細末用漿去核煎或加防風土麻仁麥門冬去心以導心熱食前調服

辰砂礪散 治初生撮口

辰砂水飛過生乾礪散其的去殼用砂一錢

蛇蛻皮炒一錢 麝香研半錢

右為極細末少許用蜜調傅唇口

急風散 治初生撮口

蛇蛻皮炒一錢 全蝎稍去毒炒一錢

釣藤七箇 牛黃半錢 麝香一字

石為極細末少許用白竹瀝入乳汁不拘時候調化服

孤孫養爲極細末用乳汁食乳前調化服

### 臍突

胎乃育孩臍乃根本胎氣固則形體壯臍深則根本固受氣重遺形萎臍突凡兒斷臍利益漸長漸深吮乳調和愈固愈實是血脈之相順致形躰之相資初生之兒有熱在胃堂則頻頻伸引呃呃作聲皆臍氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可憂無識之夫將謂斷臍不利而使之然者非也斷臍不盈亦一臍之內隨其根蒂自斷實者深之弱者淺之深淺之理以其稟賦得之此乃良由胎中母多驚悸或因食熱毒之物有作宜與藥其熱自散其臍歸本不必以藥傳之恐毒傷入爲害醫士當知之矣

照孩生下旬餘日 膺突无汗非大疾 穠水停中明所因

徐徐用藥令消釋

二豆散 治嬰孩小兒膺突腫

赤小豆不去皮 豆豉

天南星去皮研

白欬各錢

右爲極細末半錢用芭蕉自然汁調傅膺四傍一日一次三

日一次若得小腑下白即安

膺瘡

巢氏曰因浴兒水入膺中或尿濕襁褓致膺中受濕腫爛成瘡

或解脫風邪所襲入於經絡則成風癩苦癢腫不乾久則發瘡

小兒膺風撮口者因水毒傷膺中則風邪貫竅而作若兒啼



叫不止臍青出曾翻頂軟乳不通喉四肢加厥寒疳疔生為惡候不可治

水毒傷腸竅風邪入臍中面青唇口噤吐沫似癇風

喘呼臍青出胃翻乳不通四肢加厥冷寒疳命歸空

風邪早受入臍中七日之間變吉凶若見腹脹臍凸起

惡穀口禁是驚風

臍濕生瘡

臍濕生瘡腫風傷冷氣攻臍腹脹作痛桂毒必生風

封臍散

懸帶灰

乳頭髮灰

白晝灰

紅血灰四歲不夾別灰

南星

白欬

當歸頭

赤小豆

五倍子

血竭

龍骨

赤石脂煨

海螵蛸

百草霜

臘脂各半錢

右合研為極細末濕乾傳乾則清油塗急生水浴

封臍散

紅綿灰

黃牛糞灰

龍骨

乾臘脂各半錢

右為極細末濕乾摻乾清油塗臍

封臍散

治臍肉出水汁不乾

當歸頭一錢綿綿臍帶燒灰一錢或舊錦

右為極細末入麝香一小室同研少許乾摻臍

異功散 治臍中瘡

龍骨散

薄荷葉

蛇床子各二錢

輕粉半錢

右為極細末少許乾摻臍

龍骨散 治臍中瘡

龍骨散

輕粉各半錢

黃連去鬚一錢半

右為極細末少許乾摻臍

治兒滿月啼叫臍中出血用白石脂炒研極細末乾摻

治兒因剪臍傷於外風致臍瘡未乾

礬石

龍骨各半錢

右研極細末乾摻

預治

初生兒預防臍風者禁搗

散膏無靈山雞散

用軟皂色指

拭口中牙板上有筋而條

簪竹刀輕輕刮斷其筋乳點

黃連煮熟去鹹一

散三四粒

其效

慈白二子

右用童子小便煎綿裹

口中

抱兒向明看睛上有赤脈

它便亦赤睛上赤者生

下胎毒

古之方書中言兒始生者

服朱砂白朮黃連散下胎毒明者

詳之論曰今之人比古者

人起居攝養大以不同其藥乃復

脾收陽之藥若此見後以牛黃或琥珀或蘇合或沉香或救急或腹脹或腹中氣鬱或驚悸大抵萬物人之類從根本而生者若根壯實則耐寒暑免使中年之後服脾胃藥矣  
丹田三里元

凡下胎毒宜用淡豆豉煎服才與三九口其毒自下又能助  
養脾氣消化乳食用淡豆豉無益的

楊氏曰小兒在胎受病非一因也氣鬱結難開不通宜取下  
胎毒

### 禁風

楊氏曰胎受熱毒流於心脾或下為風邪侵襲自滿乃至百  
二十日見此名犯禁風不治

其證眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀不乳口吐白沫色赤鼻黃是其候也

### 風噤

聖惠方曰乃在胎久受驚熱至重

其證眼閉不開牙關緊閉口噤不乳舌瘡如粟如初覺喫乳不穩啼聲漸小色赤鼻黃是其候也急宜治之

湯氏曰百日内見此名犯風噤逆搐噤口不治

聖惠方如口開見有物如蝸牛或如黃頭白虱蠶薄切猪油擦消看兒上唇有白泡子用指甲輕輕刮破

三因方以熱帛蘸溫水入口拭破

### 口噤

巢氏病源曰小兒在胎之時母喫熱物熱入腸臟兒生之後熱毒結聚口裏舌上有形如粟米大今兒不能開口名曰口噤聖惠方曰初生兒須防三病一曰口噤二曰撮口三曰臍風皆是急病就中噤口尤甚若過一臘方免此厄但看牙關緊急不能喫奶啼聲漸小口吐涎沫便是此證急看兒上齦有白點子先以指甲刮去次後服藥

青黥口噤

初生小嬰孩 着噤口難開 臍內流鮮血 肌膚碧似苔

口噤不開

小兒口噤不開牙關者謂藥勿效生天南星去皮臍研爲末調朱龍腦少許合和用指蘸生薑汁於大牙根上搽之開

通口牙藥法誤入兒口令服枯

剃頭

集驗方云小兒初剃頭俱不擇口皆於滿月日剃之蓋氣俗所尚而產婦未得出房於滿月即與見俱出謂胎髮穢惡有穢神意令小兒不安故於此日必剃頭而出凡剃頭就溫暖避風寒仍剃後須以杏仁二枚去皮失研碎入薄荷三葉同研却入生麻油三四滴臘粉拌和頭上擦以避風邪兒生瘡疥熱毒其後小兒亦用治法

剃頭吉日

外臺崔氏曰小兒初剃頭良日宜丑寅日吉丁未日凶

小兒初剃頭胎髮忌丙丁口頭生惡瘡五月七月令兒短命



月實之辰却不妨 刻令煖處正當 若逢了未須迴避  
不信須還頭有髮

正三臨猪四五雞 二九十二子午進 十月十一卯大吉

十八巳上髮根齊 每遇十五丁不用 月頭十日無疑

不尿證

小兒初生不尿者皆因在胎之時受驚或胎毒之因氣  
氣沉於胎中見因氣血是以生下肚腹脹滿如覺臍四傍  
有青黑之色及口撮即不可救也如未有青黑色不飲乳者服  
葱乳湯

有黃白寸大者即前用乳汁半小盞同煎此時分作四  
次服即通不飲乳者服之即與乳

果木之華本寒宜也。百意速用呼呵及以葱熨令聲發越雖然  
妙理奈緣自無根本至產子育兒當知其義理哉

### 乳汁說

婦人乳汁者血也其性屬陰味甘性冷飲乳小兒因用湯水撮  
繳致口致令冷氣入腹傷動脾胃遂成大患

初生嬰兒產婦之乳未下可用猪乳代之可治驚風驚瀉

### 擇乳母

錢氏曰凡乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉是血氣所生  
乳兒當謹分察之氣未解即便乳兒則必成疾也大抵擇乳母  
一切禁忌不可用胡狐兔鼠瘦瘦腋氣喘呻嗽病者及身軀  
疥癬頭瘡髮少缺唇耳聾暗啞鼻風癩癩病獨服藥瘡麻風

毒跋足龜背蛇背鬼形惡貌等疾皆不可乳見除此外皆可用  
也緣染之久識性亦同恰如接水之造化不可不詳  
保幼須知云乳母二三日早服沉香降氣湯有奇效  
形容醜惡不宜乳 腹氣鬱結莫求 醫治  
識情方見有來由

### 乳兒法

湯氏曰夏中盛熱時乳母浴後或見啼不可遽止  
毒秋成赤白痢浴後可令定息良久熱躁乳之甚難也  
聶氏曰盛啼不可食乳恐氣逆不順聚而爲疳亦能  
千金論曰凡乳兒不可過飽飽則溢而成嘔吐若乳來多  
出授後再乳切須乳時令先令輕去宿熱乳然乳之如乳

卧寐當以臂枕之令乳與兒頭平母欲睡着時即奪其乳恐其不知飽足亦成嘔吐父母交合之間兒卧於側或驚起不可乳見蓋氣亂未定必能殺兒也

巢氏云小兒啼未定氣息不調母不可以乳飲蓋惡乳不得下停滯胃膈則爲嘔吐也爲害不輕

顧顓經曰夏中熱盛乳母浴後可令正息少久熱躁乳之方免痰病夏不去熱乳令兒嘔吐冬不去寒乳令兒泄瀉後病尤不可不謹

小兒啼未定氣息未調乳母勿遽以乳飲之故不得隔而成嘔吐此患有之可不爲戒

小兒初舉三日用飲三日之後用哺量日以爲則勿令

不及哺之道所以助穀氣然後五臟得所養矣

夜間餵乳乳母起身坐地抱兒餵之

每候早欲飲乳皆須起去宿乳

凡爲乳母者皆有節度如不禁忌即令兒百病生如是攝調可致兒無疾長壽是以春夏切不得衝熱哺兒必發熱疳并嘔逆

秋冬切勿以冷乳兒必令腹脹麤瘦

乳汁勿投於地蟲蟻食之令乳無汁可沃東壁土佳

### 乳

產婦血敗者當下禁者化乳血下不盡母致其疾乳有不調兒悟其病凡兒吻其乳有不到於膏堂氣滯精隘或冷或餒故以乳出或問之無恙否口不宜也久吮令兒神困力乏氣怯肌羸

脾家若虛遂作瀉疾及云成疾脾風定矣初生  
氣未備穀食未入全藉乳  
乳快如無恙自然臟腑充  
壯壯神氣清重則失乳如  
人絕食食為根資養性命  
乳切本只柔弱血氣輕微  
臟腑淺薄根基危脆豈可  
若失乖終甚多乳之若絀  
性命難保其或母用性不  
亂則乳汁不和乳汁不和  
令兒嘔逆且其速與療理  
必至害生小沉香煎及塩  
薑圓兼與服之當欬其驗  
舊省正氣散加枳木尤良

悲喜莫乳

悲喜令兒乳 痰涎嗽不消

停留胃膈上

吐

巢氏云小兒飲乳因冷

然不調停積胃膈之間結聚成痰

痰多則令飲不下吐痰不絕痰結微微壯熱痰食壯熱不止則發驚癇

保幼須知云小兒飽食後不食乳恐生走馬疳

哺兒

葛氏曰兒初生三日開腹助乳碎米濃作汁飲如乳駱與兒大豆許含嚥之

湯氏曰初生小兒乳哺須要得法乳者好也哺者食也乳後不得便與食哺後不得便與乳小兒脾胃怯弱乳食相併難以消化周歲以上必成乳癖食積於中作痰作熱疳病從此起也初生小兒始哺十日前如粟核十日倍之五十日如彈子大百日如棗若乳母奶少不得從此法當用意哺之却不可過飽

若兒不嗜食勿強與之強與之則不消以爲死

外臺崔氏初哺兒法以平定成日

丑寅辰巳酉日大吉男忌戌巳日女忌丙丁日哺

強施乳食令兒病

不善操舟者罪河之節與持河之罪也不善操舟者之罪也不  
善乳兒者罪兒之多病非兒之罪也不善乳兒者之罪也後漢  
王潛大論云嬰兒常病傷於此也乳哺多則生痼疾蓋小兒飢  
病多有傷患

素問云飲食自倍腸胃乃傷六抵強飽乳食自令兒信欬矣

乳今兒病證

喜乳涎喘生驚



孫兆云今兒上氣顛狂、亦今兒生痰喘急或生驚。

怒乳疳氣腹脹。

千金翼云怒乳今兒疳氣、扁鵲云女子則腹脹。

寒乳疳片不化。

史記華佗論云乳氣虛冷故令便止而嘔、千金翼云今兒咳嗽。

熱乳疳黃不食。

千金翼云今兒嘔吐、張氏云熱乳傷損、氣今兒嘔吐。

氣乳吐瀉腹脹。

寶鑑云今兒面黃白、乳哺減少夜啼、明乳。

病乳能生諸疾。

今見黃瘦骨蒸盜汗驚前夜哭孫氏云痢乳則致虛羸及  
生諸疾

雞乳吐逆生痰

靈秘云雞乳成痰涎涎雞生驚黃鑑云雞乳成妳癖又吐  
逆生痰

雞乳腹急臍冷

寶鑑云腹急而瀉胃背皆熱夜啼肌瘦一如黃塊

醉乳恍惚多驚

千金翼云令小兒執腹等痛扁鵲云醉乳而亂乳見恍惚  
多驚

淫乳必發驚癇

寶鑑云乳母淫佚情亂乳兒令吐瀉身熱啼叫如鴉不治  
已上乳急欲乳兒能主諸病不可不思也凡喜怒驚亂未定  
乳兒則成吐瀉腹脹疳黃不食寒熱壅積不散乳目則成痰  
癖涎嗽肺脹龜背醉淫喘乳多發驚癰聖惠方云醉淫喘乳  
能殺小兒聖濟經論乳者夏不欲熱熱則致吐逆冬不欲寒  
寒則致瀉瀉母不欲怒怒則令上氣顛狂母不欲醉醉則令  
身熱腹滿母方吐下而乳則致虛瀉母有積熱而乳則變黃  
不能食新產而乳則瘦悴交脰不能行大抵乳食不便則生  
疾病

斷乳法

保嬰須知云小兒年至四五歲當斷乳而不肯斷者宜用

畫眉膏

山梔三箇煨存性雄黃少

朱砂少

右爲極細末入生麻油輕粉各少許調勻候兒睡着濃抹於兩眉上醒來便不食乳未效再用加黃丹一錢

斷乳吉日

丁虛 丑斗 寅室 卯女 辰箕 巳房 午角 未爰

申鬼 酉觜 戌胃 亥壁

非吉日 三月 五月 七月忌斷乳

小沉香前圓 治疳積小兒虛中積證太極丸疳積食積脾

氣乳積腸胃久虛臟腑中脘不和痞氣等症或痢或嘔或

成腹肚疼痛兒躰羸不堪動轉者乃胃經虛弱脾生胃之

藥

沉香

乳香

丁香

木香各二錢

肉豆蔻麝香火煨去油一箇

百草霜一分

杏仁去皮尖一錢炒

巴豆十四箇去皮心油

右爲極細末煮酒封頭蠟和圓如黍米大用淡生薑湯食前服

鹽鼓圓

治嬰孩小兒嘔乳不止

鹹鼓口內含去皮七粒

膩粉一錢

右爲研如黍米大每服三圓或五圓用藿香葉煎湯食前服乳頭吻亦得

藏衣

兒衣先以清水洗之勿令沙土草垢又以清酒洗之仍內錢二  
文在衣中盛於新瓶內以青帛裹之其瓶口上仍塞蓋頭且置  
便處待滿三日然後依月吉地向陽高躁之處入地三尺埋  
之瓶上土厚一尺七寸惟須牢築令兒長壽有智慧若藏衣不  
謹爲猪狗所食者令兒癲狂蟲蟻食者令兒病患瘡大鳥食之  
令兒兵死近社廟傍者令兒見鬼近深水邊令兒溺死近故  
窠傍令兒驚惕近井傍者令兒病聲言棄道路街巷者令兒絕  
嗣無子當門戶者令兒聲不出耳聾若水流下者令兒言言棄  
於火裏者令兒生爛若著林木頭者令兒自絞死如此之忌皆  
須慎之

藏衣天德月德月空

正月天德在丁月空在丙壬 二月天德在坤月空在甲庚  
三月天德在壬月空在丙壬 四月天德在辛月空在甲庚  
五月天德在乾月空在丙壬 六月天德在甲月空在甲庚  
七月天德在癸月空在丙壬 八月天德在艮月空在甲庚  
九月天德在丙月空在丙壬 十月天德在乙月空在甲庚  
十一月天德在丙月空在丙壬 十二月天德在庚月空在甲庚  
凡藏兒衣者依此法天德月德並數埋之若有遇反之者宜以衣  
內新瓶盛蜜封塞口挂於空外福德之上同陽高躁之處待過  
月然後依法埋藏大吉 四寅旬中十日不得埋藏兒衣以瓶  
盛蜜封安置空處度十日即藏埋之

養法

千金論云小兒用文故衣緊着及女用母故衣勿使新綿衣不可過厚是傷皮膚生瘡發癩皆自此始

聖惠論曰小兒一替之內宜及壯皆須用故衣為之不可用新綿若用新綿則令兒壯熱或驚癇及天氣和暖風定之時當令乳母抱內日中嬉戲頻見風日則血氣堅凝肌肉硬窄堪承風寒疾病而少也若常高堂大廈之間則以被褥厚衣譬如陰幽之室亦不見風日不加風寒矣

小兒未春勿及新綿緇為蒸氣十暖中復於肉致引癰頂瘰是致陽氣不出故多發熱

保幼法知云小兒不令暖衣但用故絮當要緊淨仍不可露星



月之下恐惹邪祟生天漸如失收用煎灰薑湯方可

懸衣物

小兒無辜疾者古云天上有一鳥名無辜因鷄兒取物失收過夜遇此鳥遺尿之令兒啼叫諸病所主日漸黃瘦者即此鳥是八邪所得之也其八邪者飢飽勞役風驚者皆謂之八邪則令人日漸黃瘦與食不長肌肉夜間多哭身上或發微熱或熱不渴與食不知飢飽或生瘡癰是也

特護法湯氏請護安

錢氏曰小兒須着帽頂不護風池取乾薊花為枕導引今日見此已氏云乳母每日二時令摸兒項後風池若壯熱者即摸之汗出即愈風池在頭項前兩筋之處

張煥論云小兒生後滿月日尋成能識人認人勿令生人抱之仍不可見非常之物恐感分忤也

錢氏曰百晬任脉生能反覆乳母當存節喜怒適其寒溫又云半晬尻骨已成乳母當教兒學坐

千金方云小兒二百日外掌骨成乳母當教兒地上匍匐至三百日隨骨已成乳母當教兒獨之周歲膝骨已成乳母當教兒行步

小兒若能調和飲食并看承護如法則別無疾病亦不須令兒常服湯藥此宜審之

初生兒未滿月內所驅使人亦不得令有犯到於兒前惡氣觸兒兒待疾難治

初生兒出月必欲入襁褓襁褓之道必須有宜如春夏之月乃  
萬物生長之時宜放令地卧使之不逆生長之氣如秋冬之月  
乃萬物收藏之時宜就溫和之處使之不逆收藏之氣然後血  
氣調則百病無自而入矣

小兒又當有息無令汗出汗出則致虛損便受風寒晝夜寤寐  
皆當慎之

小兒所以少病癰者其母懷娠時須時勞役運動骨血則氣強  
胎養盛矣若少運動血氣微胎氣弱則兒軟弱易傷故多病癰  
小兒春夏間有疾不可亂有動下使下焦虛上焦熱變成大病  
矣

初生兒悲根汁灌即吐出惡水今無病

定命散 治初生兒口吐不乳

蟬蛻 三錢 黃連 一錢

全蝎 二錢 甘草 一錢

白為極細末入輕粉少許和

用乳汁乳末調化服

辰砂全蝎散 治初生兒口吐

辰砂 一錢 飛龍 一錢

龍腦 一錢 麝香 一錢

鵬砂

龍腦

麝香 各一錢

右為極細末用乳母嚼調金

口辰砂及牙齒上或用豬乳少

許調入口內

鎖肚散

初生兒有鎖肚證出在胎中

食諸熱物熱毒凝結於肛門

閉而不通兒生之後無復效

所以如此至七第三日不通急

令婦人以溫水洗嗽口了吸  
涎凡四五次仍以輕粉半錢  
以通為度如更不通即是  
上土齊次之須刺入二十  
快也若腹肚膨脹不能乳

哭無聲

鍾洪聲大潤遠流長形處  
不虧耳目兩竅相通大小  
固本壯氣思充實而自然  
作聲聲而為其或短或上  
不足何更投藥使成人

能兒前後心齊下手足心共七  
茶少許溫水化開時時將少許服  
門內合當以物透而通之全效為  
將藥香圓納入孔中以藥重為  
作呻吟聲至於一七難可思其生

胎之中受氣充足水火無虧之  
腸相佐所以發聲清暢是為  
理也初生啼哭發聲不出是死而  
氣不相乘醫治無效云此用肺氣  
母不悅于懷在子壯何須藥助

大小便不通

小兒初生腹脹欲絕大小便不通急令婦人漱口吸乳見乳前  
背心手足心臍下共七處以紅紙色紙貼之便自通

大小便壅

氣鬱生風熱 大便不疎洩 小便澀難通 煩渴或驚掣

小便閉

小腸心之腑也水竇流行隨其氣而利之心氣鬱熱小便不通  
心氣必冷小使多泄音澀謂澀澀也心氣寒寒小使少心氣  
苦熱小便難泄心氣積熱小便白赤先赤而後白者是所謂閤小  
便者醫謂下結腹肚脹緊澀澀不通者心氣鬱熱也心氣鬱熱  
而出乃是閉不通利于心疼痛精竭於腎速用大黃龍散除去

泥蜜少許研傳草如仍燒蠶紙原有性未必膠于膏本同研  
極細用麥門冬去心燈新同煎湯食前調服終時見效

### 小便秘澀

楊氏曰腎主水膀胱爲之腑水瀦膀胱通達於小腸也然小腸  
應於心蓋陰不可無陽水不可無火水火既濟上下相交榮衛  
流行水道開闔不失所司矣若心腎不濟陰陽不調故內外關  
格而水道澀傳送失道則水道清熱則不通冷則不禁其熱注  
者小便閉而絕無其熱微者小便澀而僅有腎與膀胱俱虛者  
熱乘之水道澀焉自今心氣旺盛小便雖通用赤茯苓麥門冬  
澄新車前子之類清利行之

### 草蜜湯

生車前搗取汁入蜜食前調服

五苓散去桂多加赤茯苓用燈心車前草煎湯食前服

捲臍法 治嬰孩小兒大小便不通

取連根葱一莖去泥土生薑一塊淡豆豉二十一粒  
搗一小匙同研細爛搗作餅烘熱攤臍中用帛扎定  
良久無透自通不通再用一餅

水通散

水通

滑石

牽牛炒

葵子各錢

右用燈心葱白車前草同煎食前服

大便秘澀



幼幼書曰五味之精華清者以養臟腑、五味之糟粕濁者皆歸大腸、吐出而不納也。楊氏曰：熱邪入心、則胃氣燥、三焦伏暑、則津液中乾、此大腸之來熱也。若食滯、則腹脹痛、胃痞欲嘔、熱氣壅灼、則內受風熱、消燥秘、無熱不躁、利黃圓積、宜消積圓胃中活法治之。

膠蜜湯 治嬰孩小兒虛秘

葱白二三莖

右用水煎、葱入阿膠炒及生蜜溶化食前服

獨棗湯

棗一枚去核入輕粉半錢

右用棗相合縛定慢火同煮熟、食棗用棗煎湯食前服

甘枳湯

甘草

枳殼煨去穢各錢

右剉散水煎食前服

血脈不斂

鄧氏曰初生兒出腹骨肉未斂肌肉未成猶尚是血血凝則堅而成肌肉其有阻斂不成肌肉則必面日口鼻乾燥四肢不能伸縮者是血脈不斂也

黃龍湯

乾地黄

山茱萸去核

山藥

澤瀉

白茯苓去皮

甘草炙

一水

白湯調取一二滴入口中

### 腦冷腦熱

小兒有腦冷腦熱者兩證腦冷則腦漿水溜下從鼻孔中出日久不差氣息甚惡熱則腦枕骨疼閉目不開或太陽穴疼痛眉啼哭或兩目赤腫

神仙二黃散 治嬰孩小兒腦冷

硫黃

黃丹炒

川白芷各一錢

右為細末每用少許吹鼻中十餘次即止

通頂散 治嬰孩小兒腦熱

川芎末

薄荷末

朴硝各二錢

右拌和研勻用葱許吹鼻中

鼻塞涕淚鼻乾

小兒鼻塞者由肺氣通於鼻氣為陽若氣受風寒停滯鼻間則成鼻塞氣寒而津液不收則多鼻涕若冷氣久不散膿涕結聚使鼻不聞香臭則鼻若挾熱則鼻乾皆阻礙乳

小兒稟賦胎氣充實三關九竅五臟六腑內外呼吸上下貫通流行有脈止順三焦者皆因所協元命自然之氣也凡產婦見三朝五日六晨一臘忽然鼻塞吻乳不能開口呼吸者多是乳母安睡之時不知恃上兒子鼻中出息吹着兒額或洗浴用水溫冷氣不避風邪所以致兒鼻塞

鼻塞不通

邪客皮毛肺中風 致令鼻塞氣難通 寒停額戶流清涕

息肉生成滿鼻中

鼻流清涕

鼻內流清涕

元因腦感寒

寒停傳顙

鼻涕不曾乾

鼻塞清涕流

手黃汗悠悠

喘促叫聲咽

傷寒外證求

開關散

香附子炒去毛

川芎去土

荊芥穗

僵蠶去嘴絲炒

細辛葉

猪牙皂角煨各半錢

右爲極細末入生葱白搗成膏用紅帛盛夜睡貼顙門

川芎膏

治嬰孩小兒鼻塞

川芎

細辛去土

藥本

川白芷

甘草炙各三錢 杏仁去皮尖七箇

龍腦

麝香各半錢

右爲極細末煉白蜜膏圓如梧桐子大用燈新煎湯研化食後

服如射者用新綿包一團塞鼻孔中男左女右

細辛散 治嬰孩小兒氣寒多涕

細辛

防風去蘆又單川芎

前胡去蘆

人參去蘆

甘草炙各錢

右爲極細末用乳香煎湯調化食遠服

萬金膏

治嬰孩小兒驚風

羌活去蘆

川芎

細辛

石菖蒲

木通去節

麻黃去節各一錢

龍腦少

麝香各半錢

右爲極細末煉白蜜圓如梧桐子大用新綿包一圓寒食日  
中男左女右

半黃犀角圓 治嬰孩小兒肺癰黃乾

牛黃半錢

犀角末

川芎

升麻

細辛

麻黃去節

甘草炙冬二錢半朱砂

龍腦各半錢

麝香一字

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用荊芥煎湯研化食後服

眼閉證

小兒初生眼閉者由產母食熱物毒物致成斯疾治法用生薑汁洗眼上  
時少許蒸水洗眼上一日七八次如三日不開用生薑汁洗眼

仍洗乳  
須要服山茵陳湯以眼開

生地黃湯治初生兒眼不開

乾地黄

赤芍藥

川芎

當歸去蘆

瓜蒌根

甘草各一錢

右爲細末少許用燈薪煎湯調抹入口中連服

山茵陳湯 釀乳

山茵陳葉

澤瀉各三錢

瓜蒌根

豬苓去皮

甘草生

生地黃各一錢半

右以咀用水煎食後服初第一服第二服且捏去舊乳第三服後却令兒喫乳不妨若產母自乳亦可服

胎毒眼



呂氏曰初生小兒須洗令淨若洗不淨則穢汁浸漬於眼目中  
使臉赤爛至長不瘥母食熱物執藥名曰胎赤

真金散

黃連去鬚

黃蘗

當歸去蘆

赤芍藥各一錢 杏仁去皮尖半錢

右剉乳汁浸一宿麝香為極細末用生地黄汁調一字頻點  
點眼新綿裹荆芥煎湯浸放溫時時洗浴母服

洗心散

甘草生

當歸去蘆

麻黃去節

芍藥

白朮

荆芥穗

大黃煨各半錢

右為極細末用生薑薄荷煎湯調化食遠服

### 血眼

胎氣克足兒將分娩胞囊已破先行清水其兒既誕血即送下緣由胎氣頗逆轉側差緩其血壓瘀睡腎遂致澀滲盛則灌注其睛不見瞳人輕則外泡腫赤上下眩爛若投涼藥必寒臟腑宜與服生熟地黃湯流行氣血或用杏仁二枚去皮尖細嚼乳汁三五匙藏粉少許蒸熟以絹片包蘸頻點重感者加黃連汁硝最良法也

### 疳眼羞明

疳眼最羞明 才開泪又傾 肝心俱積熱 生膜翳遮睛

### 省目膏

省目氣薰肝 黃昏見物難 睛雖無翳膜 內障若雲滿  
生下經旬目見紅 蓋因胎受熱兼風 涼肝心藥斯為美  
雖有痘瘡宜別攻 搖頭揉目熱攻肝 愛暗增明不欲視 省目母因風熱盛  
斑瘡肺肺翳睛漫

目腫弦紅赤 增目淚少乾 流淚生翳肉 血翳漸漫漫  
肝冷睛浮碧 青光瞻受寒 金無諸障積 晝夜不能看  
四聖散 治嬰孩小兒胎受熱毒空下兩目不開

燈薪

黃連去蘂

秦皮

木賊

棗各五錢

右咬咀用水煎取清漿洗翳目自開不拘時候

辟塵膏

治嬰孩小兒塵埃入目揩成腫熱作痛啼哭

油煙細墨

右以墨新汲井水濃磨入玄明粉半錢和勻爲膏用筆多點  
目內三五次忌酒熱物

開睛

龍木論小兒開睛候皆因失悞染打觸着頭面額角垂倒撲今  
兒肝受驚風遂使兩目開睛

牛黃膏

牛黃半錢

白附子炮

桂去皮

金匱去毒炒

川芎

石膏各二錢

白芷

藿香葉

辰砂水飛各二錢

麝香一錢

右爲極細末煉白蜜圓如茶葉大用薄荷煎湯研化食後服  
胎驚

小兒在胎中母因驚悸爲胎動胎兒當受之降生之後其兒精  
神不爽顏色虛白初則溫溫有熱其後煩亦多驚物動即起驚  
響即悸若不細搜安胎取次難爲調適既有胎驚將傳胎風之  
候產母忌食一切熱毒之物若作尋常畢竟難蓋是血脈衆  
弱臟腑虛怯不堪重劑何可攻繫是使智者怯懼有之若也輕  
受熱以自散即於項上生瘰其大如拳之曰驚氣須當破之而  
後合之勿傳毒藥恐壞肌體不惟傷壞深起有害反爲無益也  
湯莫大焉

葉氏曰小兒在胎母受驚觸而得

其證印堂青色壯熱嘔乳臍中多驚手足微掣十指如數  
久則成癇受驚之輕者青龍湯全蝎餅至聖保命丹重者  
奪命丹治之

小兒胎中累受驚則心氣不足矣若有此候當用安神壓驚鎮  
心圓散主之若見印堂浮紫痰涎吐沫搐搦不時者皆爲惡候  
吳氏云小兒胎驚者兒在母腹中十相具足或妊婦驚悸顛撲  
夫驚而心主血脉應之於胎故生下未滿月而發者是也

錢氏曰小兒壯熱吐衄心神不寧手足抽掣身軀強直眼目反  
張是胎驚風證

小兒胎驚風以胎婦調適乖常飲酒嗜慾忿怒驚撲母有所觸

胎必感之或外挾風邪有傷於胎故生乘母氣生下即病也其  
候月內溫壯翻眼握拳噤口咬牙身腰強直流潮嘔吐搐掣驚  
啼腮縮頰開或頰赤或面青眼合胎風眼合不可誤作慢脾妄用溫藥  
其有者噤撮口之類亦此一種之所發也視其面間氣色紅赤  
鮮碧者可治若黯黑青黑者不治虎口指紋盡入裏者可治紋  
反出外者不治治法解散風邪利驚化痰涎調氣

胎驚搐搦口喎斜 筋骨拘攣臉似花 口嚕涎沫哭聲短  
手足相牽臍受邪 唇青齒齲多緊急 腹臍腫起似垂瓜  
腹脹額頭青脉見 逐涎安魄命須除 面腫鵠聲蛇眼視  
名方誤說幾千車

憂懼胎中累受驚 生來緣此病停心 身肌軟弱不乾縮

戰慄多啼睡不安 臉鼻淡青 燕目碧 印堂浮紫

靈丹次第安心 免致孩兒性命傾

月前未出母之胎 因母身災子受災 腰直哭時先口撮

面青拳縮搐攣腮 此患未出胎一月前因母傷寒風傳邪入兒臟各生

身辟帶之特傷於外風亦名勝風 緣口 一身筋脉如何急

兩眼膠生閉不開 醫士見形先問母 便知此患自初來

三須退散驚風了 墜下風痰病不回

人聞此病大過微 大抵醫家識者稀 一百息全為一氣

主下面如湯發熱 定知胎熱母身肥

應須懷腹失扶持 胎上生瘡如爛疔

未滿臘月先撮口 兩拳相握項腰隨



此經臟內氣生毒 口限三朝骨肉離 男若搦指歸向裏  
女子向外可堪醫 逆候不須投藥餌 有候仍存在兩肩  
肩裏無筋青碧色 應須有命莫憂疑 肩裏有筋青碧色  
神方妙藥也難醫

青金圓 治嬰孩小色解散胎熱化痰涎驚邪

人參土蘆 天麻炭 茯神去木

白附子炮 牛膝南星各二錢

甘草炙二錢半 青黛一錢 朱砂水飛半錢

麝香一毫

右為極細末煉白蜜圓如梧桐子大用釣藤皂莢子煎湯研  
化不拘時候服

胎癰 即胎驚之異名

幼幼方曰小兒在胎久受驚熱重則成癰

止證身熱面青手足搐掣牙關緊急腰直身強睛邪目閉  
多啼不乳胎受之重者

小兒胎癰者乃孕中累受驚邪或因食毒而感若見諸癰後  
皆不可治

孕中食毒與酸鹹 物類常驚氣鬱元 長下孩兒昏眩困

膽心不足外邪干 面青唇白無時候 口禁睛翻吐沫痰

日久發頻加瘦癯 此般發候號胎癰

驅風散

胡黃連 二錢半 全蝎 去毒焙 犀角

天竺黃

麻黃去節各半錢麝香一字

右爲細末用乳汁調化食遠服

全蝎膏

全蝎頭尾全者四十九箇去毒每箇用薄荷皮包了用絲縛定

慢火土炙令薄苛乾除去薄荷

朱砂一字

麝香半錢

右爲極細末煉白蜜圓如梧桐子大用鈎藤煎湯研化食遠服

胎風

小兒生軟身頭面如火撮口不乳眉間青色握指男外女內順身冷而軟逆搖角弓反張不治在胎受驚至重

胎風者由在胎之時臟腑未具神氣未定而動靜不常過酒房  
勞或憂熱慮悶噴聲高或自開大聲驚動心神又因將養失  
宜觸冒寒暑腰理開洩風邪直入於胎中心生之後邪氣在  
臟不能宣通或吐乳暴失度於觸胎帶風者四肢若痲小調令  
兒吐乳時後面青或痰實壅積則牛壯壯時復面紅一者不已  
致令拘急驚風不安手足動搖身及強直若靜乍動即胎瀕也  
小兒胎中久積風邪若見偏搐面青唇戰拘攣者皆為惡候  
胎病變胎風 胎驚變不同 胎瀕寒腹痛 胎熱搖如弓  
胎中蘊積風邪久 長下孩兒作病端 寒熱無時腸閉結  
心胃痞滿氣難寬 手足拳攣皮燥澀 筋拘四肘若垂癱  
目眩浮赤腮瘍瘰 鶴膝多因此證傳

胎熱

某氏曰小兒在胎母食熱毒之物或熱藥令兒生下身熱面赤  
胎熱口熱如湯服五福化毒丹

小兒生下有無氣時叫哭身壯熱若淡茶色目赤大便赤黃糞  
積急食乳浴法主之更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥  
也

懷胎多患停蒸毒 孩子生來帶病容 三日唇乾時腫閉

二毒面赤帶相衝 心煩燥渴煩如飲 啼數聲焦噎不通

好把雙圓搜五臟 次憑冷法便見神功

三朝旬外月間兒 目閉胞生證可推 常作呻吟煩燥起

此為極熱定無疑

小兒生下 可赤脈赤 脈閉不開 身壯熱 口熱如燙

此皆因在母胎之時受熱毒物也 若有此證 宜令乳母

漸次解之

釀乳法 母子同煎

猪苓 去黑皮 澤瀉 赤茯苓 去皮

天花粉 茵陳 甘草 生

生地黃 山梔 去殼

右剉散用米煎不拘時候服

甘豆湯 治嬰孩小兒胎熱

甘草一錢 黑豆二錢 淡豆豉 二錢

右咬咀用水入燈蘆七葉煎不拘時候服

小兒初生有胎熱者證不可求速效法當先令乳母服藥見服乳後漸次解熱百無一失節以涼藥攻之必致嘔吐也有大患者宜細審之

胎黃

巢氏曰小兒在胎受母熱毒下遍身面目俱黃身熱大便秘小便黃多啼不乳

千金論曰小兒生下遍身面目皆黃壯如金色身壯熱大便不通小便如梳汁不思乳食啼叫不止此胎黃之極也皆乃母受熱而傳於胎也有此證乳母服地黃湯

黃相似

小兒身皮目皆黃有黃病也身痛腫背強大小便澀

身壯黃

面目指爪皆黃小便如屋漏色看物皆黃渴者難治此黃  
二證多病於大病後別有一證生下百日及半周不因前證  
微黃者胃熱也大人一同又有面黃腹大食土渴者脾州也有  
自生而身黃者胎疸也古書云諸疳皆熱色深黃者是也若淡  
黃兼白者胃怯胃不和也

胃熱身黃

胃熱遍身黃 薰蒸體似湯 瀉煩心腹脹 脉亂定知亡  
地黃湯

生地黃 赤芍藥 天花粉

赤茯苓 去皮 川芎 當歸 去蘆

猪苓 去黑皮 澤瀉 甘草



茵陳

右劉散用水煎食前服

地黃飲子

治嬰孩小兒生下滿身面目黃黑壯如金色或面

赤身無暇閉不開大便不通小便如山桅汁滿身生瘡

主地黃

赤芍藥各二錢 羌活去蘆

當歸去蘆

甘草各一錢

右爲極細末用燈新煎湯食前服產婦服抹入兒口內

畢角散

治嬰孩小兒黃疸一身盡黃

茵陳用五錢

茵陳

瓜蒌殼

枳殼

龍膽草

甘草

生地黃各二錢 澤瀉各二錢 分半

右吹咀用水煎不拘時候服

胎怯

小兒生下面色無精光肌肉薄大便白水身無血色時時哽氣多噦目無精彩當浴躰

胎肥

小兒生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸肌瘦目白睛紅紅色五心熱大便難時時生涎當浴躰

浴體法

天麻末二錢

全蝎土毒

朱砂各半錢

烏蛇肉酒浸

白礬各三錢

麝香一分

青黛三錢

右同研勻用水三碗入藥二錢桃枝一握并葉五枝同煮至十沸溫熱浴之勿浴背

鵝口

巢氏病源曰小兒乃胎受熱毒心脾最盛上蒸於口致生白屑滿舌上口中如鵝兒之口

保命散

白礬一錢 馬牙硝五錢 朱砂水飛二錢

右爲極細末每用一字取白鵝糞以水攪取汁調塗舌上額頰內未用藥時先以手指纏亂頭髮揩拭舌上垢然後用藥

傳

葛氏方 黃丹煨乾擦舌上口中即愈仍服消毒飲

# 重舌

巢氏病源曰小兒重舌者心脾熱故也心候於舌而主於血脾之脉絡又出舌下心火脾土二臟母子也有熱即與血氣俱盛其壯附舌下近舌根生形如舌而短者故謂之重舌也

小兒初生重舌者心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之絡脉出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生一物形如舌而短小是也有著頰裏及上腭者曰重腭有著齒斷者曰重斷皆當刺去其血也

小兒看舌下若連舌有膜石榴子若啼不出穀不轉速以指甲摘斷之或用葦刀子割之微有血出即活

## 弄舌

脾臟微熱令舌絡微緊時時針舌治之勿用冷藥及下當少與  
馮苦散漸服亦或飲水腎疑為熱必冷藥下非也飲水者脾胃  
虛津液少也又加石膏肌瘦五心煩熱即為疳瘦加胡黃連圓  
輩大病未已用藥弄舌者凶

積熱心胃多煩渴 舌乾澀腫活無因 南鵬腦癰并疑水  
更與分筋妙手針

孩兒胎受諸邪熱 熱癰三焦作重舌 或成鵝口證堪憂  
用藥更須針刺裂

鵝口重舌一般調 牙根風腫熱上焦 此號腹中傳毒熱  
舌不呬妳口內謠 有時睡裏多驚搐 時時虛汗熱來潮  
莫教錯認諸家病 看取巢元子細標

弄舌舒舌

弄舌微微露即收

得於病後最難瘳

出長收緩名舒舌

繞在心脾不用憂

舌腫無聲

嬰兒患重舌

啼叫哭無聲

面色頻更變

驚夜命必傾

一弄舌生驚

弄舌生驚極

牽睛引皺眉

涎流空歎氣

唇撮口如吹

烏魚散

治嬰孩小兒心脾有熱則血氣俱盛其舌下近舌根

生形如舌者謂之重舌

烏魚骨五錢

蟻蝦

清薑片各一錢

白礬石煨半分

右為極細末用雞卵黃調勻塗舌上點津無妨

青液散 治嬰孩小兒鵝口重舌及口瘡

青黛一錢

龍腦一字

朴硝一錢

右為極細末用蜜調鵝翎少許傳

當歸尾 治嬰孩小兒心脾有熱舌下有形如舌而小者

名曰重舌及唇口兩畔生瘡

當歸尾

連翹

川白芷各三錢

大黃煨

甘草各錢

右入咀用水煎食前服

一捻金散

雄黃二錢

鵬砂一錢

腦子半錢

甘草半錢

右爲極細末乾摻舌上或用蜜調鵝翎蘸刷

瀉黃散

藜蘆葉三錢半 山梔六錢五錢 石膏二錢半

甘草二錢 防風二錢

右剉散用水煎不拘時候服

木舌

聖惠方云木舌者脾之脈絡在舌下心主舌其臟腑壅滯心脾積熱氣隨脈上衝於舌初則舌腫漸漸大塞滿口中是爲木舌若不急治必至害人凡小兒重舌切不可用手去按按則舌根損長成話不正因此得之



川通散

朴硝五錢

真紫雪分

鹽半分

右為細末入竹漚三兩點用白湯調傳發津無妨

垂離

呂氏云初生兒喉舌上有物如蒼蠅壯者謂之垂離

錢氏云蓋由胎毒上攻血氣不斂也如有氣脹起急以綿纏長針留刀處如粟米許以利之如重更血水泄水用鹽湯洗如聖散

鈴霜錢

牛黃

太陰玄精石

辰砂水飛冬分

右為細末入龍腦一分研勻按口內患處

懸癰

千金論曰小兒出腹之後且無氣收斂成血則口肉舌上赤癰  
裏自清淨也若頰裏舌上赤物如腐爛膿血者乃懸癰可以線  
纏長針留刀處如粟米許七八以刺之令泄去青黃赤血汁先用  
鹽湯洗拭次用蜜調一字數少許塗刺處離刺之一刺且止如未  
消次日再刺不過三次自愈

一字散

朱砂

鵬砂各半錢

龍腦

朴硝

方為極細末用蜜調少許鵝翎刺口內點下無妨

重鰕重鰕

初生兒有重眼重睛者由其血氣不收斂成肉故頻重眼上有物  
如蒲蘆盛水壯腫者名重睛有青齒齙者名重齙治法當以線  
縫長針留刀處如粟米大以刺之令泄去血汁先用淡鹽湯洗  
拭次用一字散即愈又兒口裏舌上有白屑者名齙口齙未須  
服藥當以天南星散貼腳心次用青液散

### 天南星散

天南星 生去灰漬

右爲極細末用醋調塗腳心男左女右厚皮紙貼如乾時再  
用醋潤

### 麥門冬散

治嬰孩小兒胃中客熱口氣作臭不思乳食心驚

煩悶齒齙痛腫出鮮血

人參去蘆

酒冬去心

天門冬去心

生地黃

熟地黃

赤茯苓去皮

白朮振去皮各二兩

甘草炙一錢

有以酒煎水煎不拘時服

### 丹毒

經云赤紫丹瘤皆心火內蘊而發赤如丹砂故名丹毒心主血而大性熱血熱相搏陰滯於陽即發丹毒心虛寒則痒心實熱則痛自腹生出四肢者易治自四肢生入腹者難療先用表藥治之有身上發時亦如前證不甚燥痒但見出浮於遍脉神昏不悅名陰濕毒證若入腹入腎多致危重不可輕視如常自取困爾

熱毒與血相繫而風乘之所以赤腫遊走而偏腫也此由乳母  
酒麵煎炙過度塊夫烘衣與兒不候冷而即着多成此疾或發  
於手足或發於頭面皆令兒燥悶腹脹其熱如火痛不可忍  
總有人服入腎之證便不可救藥通謂此毒散如紫草茸外用  
青黛土朱研極細末用井水入蜜調傳丹之名有種最多究其  
以熱毒與血相搏而風乘之有赤腫而遊走遍體者入腹入腎  
而發人亦由乳母酒麵煎炙過度或與兒烘衣不候冷而即着所致  
丹壅熱毒氣客於腠理傳於血氣發於外上赤如丹片白如散

四

陳氏曰丹有五已乃血熱風毒有感有寒夾冷夾熱故其治法  
亦不同大抵諸毒皆屬於心主血熱而血之熱古人以升

者謂心應火而色赤也乃心家血熱風以動之是以遊走遍身  
初生自背腹流散四肢易治自四肢流入腹入腎則殺人矣  
阮氏曰治丹毒必先服藥內解熱毒方可塗傳免毒氣無所泄  
而入裏害人

湯氏曰所謂丹有一十五種又有赤遊風及爛瘡本專方以十  
種治

熱厥生風癰

我然發遍身

火得并赤腫

致毒亦驚入

毛竅風邪觸

皮膚癰瘡招

臟中加熱毒

赤腫轉難消

壯腹臍青出

通身黑點焦

心膨加喘氣

定死在昏朝

小兒丹毒候

壯熱作驚啼

脚膝連隆腫

岐溪苑不知

見在胎時母受驚

驚傳邪熱子傷神

忽然赤片微起

涼解肌清熱見寧

小兒氣弱肌膚薄 熱毒乘虛來發作 急須化毒與清風

毒發風消始安樂

臍腫出漿 面頰紫浮 啼喘不乳 皮肉白脹 手足拳攣

大小便絕 胃背血點 舌上瘡黑 胸緊腫

十腫丹

飛龍丹從頭頂腫起搗生葱汁塗

古龍丹從頭上紅腫起赤小豆雞子清塗

鬼火丹從面腫起竈心土雞子清塗

天火丹赤點從背起桑根白皮末羊膏塗

天龍丹從兩背赤腫黃色柳木灰水塗

水丹從兩脇虛腫生鐵屑水猪鬃塗

胡火丹從臍下起黃腫橫柳末米醋塗

野火丹從兩足赤腫乳香末羊脂塗

煙火丹自兩足起有赤白點猪槽土土塗

明漏丹自腎上起黃腫屋漏虛土土塗

水黃散 治嬰孩小兒赤流丹毒用小鼓刀子疎去膿血量

惡血毒汁

土硝五錢

大黃半錢

右為極細末用新井水調勻塗

葛根白朮散 治嬰孩小兒毒白丹毒腫

白朮錢

茯苓去皮三錢

木香錢半



甘草二錢半

葛根炒二錢

枳殼去穢炒一錢

右剉散用水煎不拘時候服

犀角消毒飲

治嬰孩小兒風毒赤紫丹瘤壯熱吐瀉驚臥不

安胃膈滿悶咽候腫痛九道有血妄行瘡毒丹毒

牛旁子炒兩錢

甘草二錢半

荆芥穗五錢

防風去蘂一錢半犀角一錢半

右剉散用水煎不拘時候服

驚風散

治嬰孩小兒泄赤丹毒如瘡目上赤腫以白丁而上

至腹必死初發急以此藥敷之

原缺

毒胎氣所受其兒視胎之後所發熱毒之氣悉皆取於母平素古  
係於心唇干於脾所言心脾熱是也欲以下其氣亦可利微腸  
但以吳茱萸末醋調傅脚心移夜即愈藥性雖熱能引熱就下  
其功至良又有心肺熱者瘡潰膿膿利作數點胭脂紅漸散斑  
如丹加之身軀有熱但禁火氣則無恙矣

小兒口瘡赤心臍熱口瘡白脾冷口瘡黃脾臟熱

嬰童寶鑑云口瘡乃心臍積熱出發於口也

其發乳到兒口即啼及乳不穩

心脾胃熱蒸於上 舌白牙根肉腐傷 口角承漿分兩處

有瘡難異治同方

龍腦散 治嬰孩小兒上唇癰熱頭目疼痛口內生瘡

薄荷葉

川芎

為活去盡

防風去盡冬三錢 僵蠶去盡冬三錢 甘草生冬三錢

右為極細末每一字用燈薪麥門冬玉心煎湯調化食遠服

口瘡方 皂莢白礬亂頭髮三味煨存性為極細末傳

口瘡方 五倍子為極細末用井水調傅脚心

口瘡瘡爛方 亂頭髮煨存性為極細末用猪脂調傅

湯氏方 用竹瀝點黃連黃蘗黃丹煨為極細末傳

取竹瀝黃竿竹一筒兩頭截去節用磚一筒安在竹上以炭

火中央燒竹瀝自出

獨勝散 縮砂殼煨存性為極細末傳

○咽喉

咽喉者爲一身之總要與胃氣相接呼吸之所從出甚稠精之  
間蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而爲咽喉之病喉內生瘡  
或壯如肉腐爲腫爲痛窒塞不通吐熱不下甚則生出重舌治  
之尤宜先去風痰以通咽喉然後解其熱毒遲則有不救之患  
又有熱毒衝上上腭而生瘡謂之懸癰及肺寒亦能令人咽喉  
吞吐不利臨病詳審治之

咽喉之疾不傷熱毒上攻也四時受熱藏心肺之間一旦所觸  
上攻咽喉所謂腎傷寒也然其證有單肉蛾雙肉蛾有重舌上  
舌胖腫有懸癰腫脹有重舌皆腫甚者上攻頭面皆腫大法先  
洗去口中舌上白胎其次掃去風熱  
單雙肉蛾可針則針  
有不可針者則用熏摻藥退後方依次用服藥如是木舌服藥

之外仍用慘昨則用塗藥輕者但服藥而自退不須用針及藥點其瘡當自消也

腫咽喉痛

咽喉中痛 咽乾嚥物難 有痰風熱作 涎喘不寧安  
咽喉閉腫肺家殃 心熱多痰口舌瘡 都緣風盛三焦熱  
鵬砂龍腦藥為良

化毒湯 治嬰孩小兒解風熱上攻咽喉腫痛乳食不便

桔梗去蘆炒五錢 薄荷葉 荆芥穗

甘草各二錢半 山豆根一錢半 牙硝

鵬砂 朴硝 雄黃水飛

朱砂水飛各二錢

右為極細末，或溫湯調，不拘時候服，少與含點。

甘桔湯 治嬰孩小兒感冒風熱，入氣重，道痰壅塞，上

喉腫痛，接氣不順，咳嗽失音。

人參<sub>三錢</sub> 廣<sub>五錢</sub> 桔梗<sub>蜜炙炒一兩</sub> 甘草<sub>半生半炙二錢</sub>

右剉散，用水煎，不拘時候服。

立效散 治嬰孩小兒咽喉痺痛，不能吞嚥。

鵬砂 龍腦 雄黃

朴硝<sub>各半錢</sub>

右為極細末，乾摻。

吹喉散 治嬰孩小兒咽喉腫痛，氣塞不通。

甘草<sub>生三錢</sub> 朴硝<sub>一兩</sub>

右爲極細末乾摻喉中如腫甚者用小竹管吹入喉內

### 纏喉風

小兒纏喉風者乃心胃鬱熱生風積聚痰而作也若青黑其  
噎頭低痰如膠色不可治

心胃痰毒積多時 熱蘊生風最敗之 面赤氣急喉腫閉  
纏喉重古急求醫 鼻唇青黑乾焦縮 塞噎頭低痰漸危  
涎結如膠鳴似鋸 看看朝暮死將期

### 一頭瘡

王氏曰小兒頭瘡多因胎熱及腎上衝之所爲也

小兒頭瘡是六陽受毒熱而攻頭成瘡也若頭上散成片常常  
落髮毛髮稀少有類白屑此因積熱上攻名曰禿瘡瘡雖生於



頭世人只知

頭者諸陽所

故常生於頭

可矣

頭面半

五臟不和同

經云五臟不和九竅不通六腑不和血結為癰

血熱生瘡

血結生瘡疥

膿裏綻若珠

瘡癰發不已

痛過腫皮膚

滿頭及額生如癩

但用連床得安穩

遍身癩潰更煩

一抹金塗無不快

連床散

治嬰孩小兒滿頭如癩瘡毒及手足身上陰部腐爛

痒則抓爛黃水汁淋搗爛痛

黃連

去麩土

蛇床子 各一錢半

五倍子

去土 各二錢二分

藥粉 二十五貼

右為極細末先以煎芥葱同煎湯洗拭乾後用清油調傳

四黃散

治嬰孩小兒身上熱毒瘡疥燥痒抓破有汁不乾

黃連

去麩

黃蘗

黃芩

大黃

滑石 各二錢

五倍子 各一錢二分

右為極細末用清油、桐油同調傳

解毒冰黃散

治嬰孩

見風熱毒瘡

黃連

黃芩

黃蘗

山饒去灰

大黃

黃連去毒

糯米各錢

右爲細細末水調塗

○走馬油

此證多因氣虛受寒及有宿滯留而不去積溫成熱虛熱少氣  
上熱或食甜酸鹹膩之物而脾難甘積滯日久則熱上攻於上  
致齒黑爛間出清血而聚成膿膿其成膿候齒自齒痛  
難食破乳食不便面色光浮氣喘熱作者走馬疳治之先以  
鹽及以溫鹽水灌漱或軟雞翎蘸鹽水拂洗累試訖若經久不  
愈者傳於唇之上下乃成崩砂諸或先發滿腮齒落骨露飲食  
痛少氣促痰爲必致危矣

以水為命名蓋齒屬腎主虛繞受邪熱疳氣直奔上焦初  
作亡氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽熱  
血逆出名曰宣露甚者牙皆脫落名曰腐發既腐齒不復生矣  
傷寒熱毒上熏蒸面色光浮氣喘生口臭齒焦脆有究  
馬疳如此是真形

真黃散

治嬰孩小兒走馬牙疳

雞腔真黃皮不以多少油燈上燒存性研極細末入  
黃蘗白礬煨麝香一字用米泔水攪口內貼

口效散

青黛

黃蘗末

白礬煨

五倍子末各二錢

右為極細末用米泔水攪口內貼

燒鹽散

治嬰孩小兒疳積牙根肉潰爛臭

鹽一

右大者兩箇入鹽滿殼煮作一合或三五箇安在火內和鹽

燒透取出地以方等蓋定性候冷入麝香少同研極細末用

米泔水攪口貼勿用紙裹其合處有腫痛即止濕

內金散

治嬰孩小兒疳積肚痛泄瀉

雞內金一錢 麝香一錢 白芷五錢

麝香一錢 麝香一錢

右為極細末用溫鹽水攪口貼

牙疳散

本草綱目

金

冰珠七箇

銅青二分

千年沉石炭半塊

白礬煨一角

右爲極細末米泔水攪勻貼

疔瘡

人生自孩提以至弱冠潮熱發瘡皆由氣便然蓋疔毒起其精隨血其肌膚虛腐疔熱流注遂致遍身熱瘡發歇無已小兒諸病不出於疔則出於熱熱則生痰常須識此矣

疔蝕女陰有疔深者自然生毒

疔蝕人中腫或作癰浸淫痒作瘡 白膿如帶下 久能必瘥

黃

○ 蟲咬下部

疥癩攻下部

侵蝕至肛門者

痔漏瘻管

此藥

作根

疳瘡方

白礬煨

五倍子各二錢

右為極細末藥水洗淨貼

疳瘡

人頭亂髮一錢燒灰末按上瘡口瘻口同研極細末用

藥水洗淨貼

瘰癧

瘰癧是臟腑火伏熱積而結成瘰癧肉色赤中及項下瘰癧

如種多利生枝葉次而多謂之瘰癧也

一證之繁名曰九痛究其所因似熱證者壯非一不過  
陽氣命為大藥初發於頸項頸肉之筋本脈者衛本引未而  
以表土針之灸之傳之從其所因而解熱然小兒頭項痛針  
灸但以服餌塗貼之劑為治此疾多生於耳後及頸項兩旁初  
發止是一枚次必連生大小十數連繞項下累累如貫珠者隨  
先腫作膿穿破輕者可愈重者難愈先元漏膿長歲不乾謂之  
漏項原其得病之初自是三陽感風風熱與血氣相連而致風  
燥毒野味其證不致再作

瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頰頰底  
在頸下連缺盆者謂之瘰癧或在胸腋之側或在兩脇者謂  
之馬口手足少陽主之



瘰癧結塊

瘰癧本因肝 連珠核數服 項瘰癧結塊 瘰癧卒難安

初發原於耳項旁 證輕多謂是無妨 因清作腫成膿後

穿破名為瘰癧瘰癧

瘡口赤黑 內潰青爛 穿過透喉 乳食不通 口腫舌出

其出甚膿

瘰癧皮散 治嬰孩小兒解瘰癧瘰癧作腫疼痛

瘰癧皮去瘰癧皮此藥在瘰癧皮內包瘰癧葉示也

不傷多少切碎用水煎溫湯洗

瘰癧散 治嬰孩小兒瘰癧瘰癧不乾

全愈心鑑真

右為極細末先用搗皮散洗過後用清油調傅

本散 治法同前

降真香

降真香

海螵蛸

五時子去未全散

左為極細末先用搗皮散洗過後用傅用紙浸封掩三五次

○ 瘰癧

夫瘰癧者皆因臟腑不調風邪失守而得或有積毒或是風化為蟲或則熱氣有盛或是驚入皮膚其大者是滯於血脈而橫出於皮膚之間若節其氣血則易破若或風纏則生其癰瘡或是外邪所入即多燥痒而不定其為毒則滯死其血氣久則成膿也或作瘰癧者為本無物亦雖其血氣在臟而為積在體故

出皮膚為瘡發遍身而四肢難較風瘡亦發遍身其形甚小世  
呼為疥熱瘡發處不定即潰其血故曰瘡熱果瘡常發於脛  
後生其氣聚而生毒如蠱子蓋因腹中蟄蟲隨氣化其瘡即發  
而再發成片如癬相似此有死血瘡若以藥傳較只是歸脫  
中須是取却毒方瘡及與熱蟲藥

驚瘡

驚瘡若發在四肢手足腕時亦難瘡宜服驚藥

癰過瘡

癰過瘡是肺熱也

石瘡

金銀散 治嬰孩小兒眉間生瘡名練銀瘡

煨金銀鍋 輕粉半錢

右爲極細末用麻油調傳

月蝕瘡

薔薇散 治嬰孩小兒月蝕瘡

薔薇根四錢 地榆皮二錢 輕粉半錢

右爲極細末先用鹽湯洗過後傳

小兒刀今指月兩耳後生瘡欲斷名月蝕瘡用蝦蟆末傳

鼻瘡

霍亂傷肺肺主氣通於鼻風濕之氣乘虛客於皮毛入於血氣  
故鼻下兩旁瘡濕痒爛是名鼻隱甘瘡不痛汁所流處擇之

瘡

澤瀉散

治嬰孩小兒肺積鼻淵鼻塞及鼻下赤爛

澤瀉

鬱金

甘草炙

山梔仁各等

左為極細末用甘草煎湯調食後服再用青金散

青金散

銅青

白礬石各一錢

左為極細末傳

先鼻瘡

用熊膽泡湯以新小筆點鼻

○傳耳

嬰孩寶鑑曰耳者宗脉之所聚腎氣之所通小兒腎經盛而有熱氣上衝於耳津液壅結則生膿汁謂之傳耳亦有五般常

有青膿出者謂之停耳紅膿出者謂之膿耳有膿出者謂之耳  
耳白膿出者謂之纏耳裏面虛鳴有青膿出者謂之裏耳病雖  
有耳其源則一或由風水入耳而內有積熱上壅而成若不速  
治久則成聾

耳者腎之候小兒腎經氣實其熱上衝於耳流膿涕淚無節焉  
稠膿為清汁者此也亦有沐浴水入耳中水濕停滯傳於血氣  
醞釀成熱亦令耳膿久不瘥者變成聾耳

膿耳成聾

腦戶停風熱 熏蒸耳作膿 腫疼因熱聚 氣結亦成聾

龍骨散

白礬煨錢 龍骨煨錢半 黃丹炒錢

臘脂半錢

麝香一字

右爲極細末先以綿杖子屢却耳中膿不用藥末一字摻在耳內勿令風入耳加海螵蛸末半錢

麝香散

蜘蛛一箇

臘脂坯子半錢麝香一字

右爲極細末鷄毛管吹藥入耳內

耳癢方

黃連去鬚

蛇床子各錢

輕粉一字

右爲極細末鷄毛管吹藥入耳內

○ 耳癢

小兒年六頭縫開解而不合也腎主髓腦爲髓海腎氣有虧腦

顙不足所以頭顙闊而不能合腦髓入少如水無撥不過十日終成癆人

巢氏云顙大頭縫不合如開解故曰解顙此由腎氣不成故也皆不能合凡為此疾不達十日必為癆人

湯氏曰設有此證不可束手待盡宜依

錢氏云補其腎萬一有可生之理生下而顙不合腎氣不成也長必少笑更有目白睛多眵白色瘦者多愁少喜也餘見解

又

小兒解顙者乃兒頭骨開解此謂解顙因母懷胎五箇月被風雨雹雷電驚胎令兒生下顙骨開也

小兒顙顙未合乃氣虛所致

常



解頤馬膝

小兒解頤者多因胎氣不全血氣弱故頭作縫久則骨中昏  
昏蒸作肉乾皮黑傳鶴膝矣

小兒稟氣不足肌肉不充肢體柴瘦骨節皆枯如鶴之膝名爲  
鶴節

顙腫或陷

初生小嬰孩 惟怕顙門開 胎風憂顙腫 顙陷亦多災

顙門低陷

顙陷形容瘦 髮傷乳所爲 瀉黃白水 嘔吐因難醫

顙門腫起

顙腫青黃筋 莖煎又怕驚 吐涎并嘔乳 風引動雙睛

顛腫頭大

顛腫頭皮急 風攻腦縫開 縫開頭必大 筋緩頭難擡

顛門開大

顛大頭成縫 胎中母氣衰 父精因不足 肌腠致疳癰

頭顛初見如開解 腎弱元虛大可憂 補腎調元是良藥

投之不應定難瘳

解顛鶴膝肺傷寒 顛腫因驚胃氣攻 五行運胎氣促

虧目定視肝臟風

受氣不完頭作縫 無時溫壯證多端 臉青目碧唇乾白

頻唄胎中胃受寒 血少躰漸羸 髮落 手拳腳縮旋枯乾

傳成鶴膝皮焦黑 血凝筋凝治轉難

地黃圓 治腿膝小兒真氣不足肌肉不克時熱聚瘦骨節  
露如鶴之脚名曰鶴節

地黃熟六錢

山慈更去核

山藥

當歸去鬚

澤瀉

牡丹皮

白茯苓去皮各三錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用熱水化食前服仍用大  
天南星炮去臍皮研極細末入米醋調傅於紙帛烘熱貼  
人參地黃圓 治嬰孩小兒顛癲開解頭縫不合名曰顛解此  
乃腎氣不成腎主骨髓而腦為髓海腎氣不液所以腦髓不足  
故不能合

人參三錢

地黃熟四錢

鹿茸炙

山藥去皮

白茯苓去皮

牡丹皮去心

山藥黃去核各三錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用人參煎湯調吃食遠服

調元散

治嬰孩小兒稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦腹

大如臆致語遲行遲手足如筒神色昏慢齒生遲者

山藥去皮五錢

人參去蘆

白茯苓去皮

茯神去皮

白朮

白芍藥

地黃熟

當歸去蘆尾

黃耆蜜炙各二錢半

川芎

甘草炙各三錢

石菖蒲二錢

右吹咀生薑三片煮

一箇去核同煎不拘時候服

烏附膏理顛門陷

綿川烏

附子

雄黃

右為極細末用生葱根葉

爛入藥末同在掌心調成膏貼

陷處

冷證

脉沉而微遲證面色青白身冷口氣冷大小便自利手足冷  
乳食不化隨證用藥治之

中寒

其證手足厥冷寒顫口噤口吐涎沫不能啼哭

史氏方 用食鹽同吳茱萸炒給包紮臍腹

胎寒腹痛

小兒胎中受寒面色青白四肢厥冷腹痛盤腸內癰多啼  
嬰孩奇書小兒胎中受寒於臟傷動胞胎胎生下不能將護再傷  
外風

其證面色青白四肢厥冷手足顫動似大人瘡或禁口不  
開乃胎寒也或作盤腸內癰因寒而得

面青且鼻如青黑 寒競無時乳不食 沉瀄昏昏偏愛暖  
遍身如粟怯衣單 胎中虛冷攻脾胃 乾嘔無時咽反難  
氣血漸羸肢體瘦 溫中止氣始痊安

孩兒百日胎寒候 足曲難伸兩手拳 口冷腹膨身戰慄

晝啼不已夜嚔煎

當歸散

當歸去蘆

黃耆蜜炙

細辛去葉

橘皮去白

桂去皮

白薑生

縮砂去殼

甘草炙

右剉散用生薑一片糯米四十九粒同煎食前服

溫中湯 治嬰孩小兒疳寒腹痛

木香

橘皮去白

檳榔去穢

桂去皮

白薑生

甘草炙

右剉散用水煎食前綿蘸服

消積飲 加丁香生薑棗六核同煎食前服

鐵寒腹痛

湯氏曰乳母食冷觸胃風寒令乳夾冷氣入兒腹中遇夜

半陰氣又盛或失蓋今見膝冷作痛多啼大便瀉青白  
四君子湯

人參去蘆

白朮

茯苓去皮

甘草炙

右判散生薑三片棗一箇去核加丁香同煎不拘時候服以  
熟艾烘熱用絹帛包頻熨臍腹

盤腸

男名疳腸

女名盤腸

氣和乃升降安樂之由也氣逆則壅結疾病之致也知幼有患  
盤腸非暴所得元由氣鬱積久不散聚壅衛結五臟六腑無一  
舒暢其氣乘虛發作不流上下結不隘于腸胃之間有聲輟轉連  
連而設如搐吐惡視之不忍何以所堪嗟乎一身四大無主又



有對腸一證寒氣壅結內不伸舒雖不引氣鼓動臟腑皆實與  
臍上下對促躬曲偃僂就急疼痛二候既作醫該驚寒然俱氣  
所患受發不同盤腸宜服勻氣散加沉香煎調氣順助根本方  
佳勝也

其證偃僂腰曲乾哭無淚額有汗

盤腸氣痛頭先曲

無淚多啼眼乾哭

口開腳冷上唇焦

頭汗如珠濕漉漉

醫士須用釣藤膏

順氣化痰除火哭

腹上一塊腳如冰

腰曲如弓面色青

小便頻數腸中結

四稍汗出哭無聲

都緣冷積傷脾胃

不思乳食因沉沉

停積傳流或成痢

腹脅纒腫命難任

小兒有積號盤腸

如刀紋腦痛堪傷

痛來難忍面青黑

體硬如弓更發張 此是腸中傷毒氣 醫士何必用名方

但須溫氣溫中藥 免致孩兒受苦殃

盤腸痼病令兒哭 氣刺攻衝聲漉漉 臍上如蛇隱見形

發渴無時因積毒 十歲上下多有此證

遍身冰冷 唇臉青顫 腹滿乾鳴 湊心刺痛 手足甲黑

氣公大汗

釣藤膏

乳香

沒藥

木香

薑黃各錢

木鼈子去殼五箇

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用釣藤煎酒研化食遠服

調中散 治嬰孩小兒盤腸氣腹內集痛

青木香

川棟

丁香

沒藥

人參

茯苓

白朮

桂枝

白朮十炒半生半下五粒

右制散用葱白半寸鹽一檢同煎食前服

勻氣散

治氣滯不勻胸膈虛痞宿食不消心腹刺痛除脹滿

噎塞嘔吐惡心調脾胃進飲食

丁香

檀香

木香

白豆蔻

薑黃

甘草炙各八錢

縮砂土五錢四錢

右為極細末用鹽湯調化不拘時候服

湯氏方

用葱一握水煮湯淋酒凡服以葱類對胃膈良久服出

痛止

又方 乳香浸藥水香用水煎食前服

阮氏曰 研乳香用燈新同研碎宜順手研忌逆行

內疳

驚風內壅腹痛多啼唇黑囊腫便反張腹內有紅筋斑血者  
口全黑氣壅結熱驚風而待之又盤腸氣與蟲證亦令腹痛多  
啼便便相苦也盤腸氣痛則腹中乾嘔額上有汗是小腸氣必  
氣所搏狀爾蟲痛則嘔吐清沫痛有去來是疳化為蛇藏於胃  
滯然爾內疳用調氣陳風鎮驚之劑盤腸氣用溫和調氣之  
藥參用去蟲之藥詳審之

盤腸內疳脹身哭 氣病發時曲臍腹 每夜多啼宜早治

胎中有毒胎間搐 百日內外多有此證

內癰多啼請細看 莫爲蟲痛一般般 蟲痛吐涎唇口紫

內癰還同黑一般 但視眼頭紅脉見 須知驚候本根源

溫臟鎮驚施妙手 管交孩十命全安

桃符圓

銀朱半錢 乳香一錢 蒜煨一箇

右爲極細末同蒜研勻圓如黍米大半周五圓用薄紗煎湯

食遠服

天癰

天癰壯熱驚悸眼目翻騰手足抽搐或啼或笑喜怒不常甚者  
瓜甲皆青如祟之壯蓋由乳母酒肉過度煩毒之氣入乳逆後

乳兒遂使心肺生熱痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此爾治法  
解利風熱

錢氏云小兒心膈壅滯邪熱痰涎纏綿積不得宣通或乳母飲酒  
食肉無度煩毒之氣流入乳中令兒宿滯不消邪熱毒氣乘於  
心膈致使驚悸眼翻騰壯熱不休四肢瘰癧名曰天癰

天癰候非天癰人也因驚熱盛而成初得之時頻頻呵欠眼中  
忽然有淚不落壯熱不時手足搐搦脈浮實洪大

尋常天癰病 休道小兒嬌 積熱心留滯 眸翻涎欲潮

復仰多因取 仍兼唇口焦 愚醫尤灸焙 必死在三朝

地上坐時睡 驚風本在肝 夜啼并面白 肺臟與詳觀

顏色時時變 心形日日看 喘麤脾臟乏 咬齒骨家寒

面自腫虛多吹乳 四肢煩熱汗頻生 雙眼赤赤時時

惡叫元來盡屬驚

天麝丸因積熱深 涎潮心絡又多驚 雙眸翻白眼焦

呵欠頻頻疾便生

釣藤散

釣藤 人參去虛 犀角各二錢半

甘草各二錢半 全蝎去毒焙半錢 天麻一分

有吹咀用水煎不拘時候服

天竺黃散 治嬰孩小兒天癰目睛釣土四肢癱瘓

天竺黃 臘茶 甘草各二錢

全蝎生薄許炙炙七箇 紫豆半生半炒半粒

五引心金真

荊芥穗

白礬

雄黃水 半錢

方為極細末用人參煎湯調頗赤者生薄荷煎湯調化不拘時候服

內癰腹痛

病源曰驚風內癰腹痛多啼汗出驚青咬乳服慢流涎或唇焦里囊腫偃僵反驚眼內有紅筋斑血虎口脉紋入掌服青龍湯加釣藤釣于七箇不吐兒角下七粒薄荷同煎食遠服

腹脹內癰

初生小嬰孩 腹脹日隆開 內癰終難止 驚風搐再來

蛔厥腹痛

幼幼方曰蛔厥多以慢驚但客口紫



易氏曰每月初五日己前蟲頭同上取已後安之

其證愁啼乾痛吐清涎人中一唇中鼻皆為小兒多蛔蟲

名食蟲 苗蟲亦名猪蟲 胃蟲 蛔亦名血蟲

化蟲散

雷丸

鶴虱

甘草

大黃生各二錢 史君子去殼土黃

右為極細末用猪肉煮汁調食前服

蛔蟲咬痛

本為從來與物羅

蟲生於肉瘦肌膚

受甘饈食多生痛

痛便聲高命欲殂

形疾人中之上見

鼻頭唇口一齊烏

床涎若定蟲方退

取下蛔蟲方得無

史君子散 治嬰孩小兒蛔蟲咬痛口吐涎沫

史君子 去殼

左為極細末用米飲調五更早空心服

痘痢冷痛

惡哭痘疳蟲咬心 吐涎積冷痛難禁 恣食生桃并冷硬

蟲生致使患深沉

檳榔圓

檳榔 去漆

鵝虱

買衆

乾漆炒存性

蕪荑

川棟子 去炭核

史君子 去殼

雷丸

雄黃水飛

輕粉 少許

巴豆去皮心油三箇水香

新丹

錫灰炒不見火

右爲極細末酒煮麴糊圓如黍米大五更早用猪肉熬酒煎  
將肉細嚼莫吞引蟲頭向上使用肉汁調化蟲散服檀榔圓  
至巳時取下蟲進飲食

夜啼

小兒夜啼者非是鬼神爲祟蓋因胎熱伏心陰則與陽相形熱  
則與陽相合腹中燥悶所以驚啼

夜啼者小兒臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則爲陰極發燥寒  
盛作疼所以夜啼而不歇也

然各有陰陽冷熱之不同惟夜啼乃陰盛於夜爲臟冷之證陰  
極發燥寒盛作痛啼而不哭是痛故直聲來往而無淚哭而不

啼是驚故連聲不絕而多淚

濱山云啼而不哭爲煩哭而不啼是燥陰陽之分人在此

其證腹冷而痛面青白頭低身曲大便瀉青白眼閉肚緊

夜半後發

積熱在心爲熱所乘炎上而焦哭澀熱面紅舌白腹熱小便赤  
啼時有汗在半夜前啼先當清導小腑重則胸突頭反喜燈宜  
疎利

有客忤中惡兒目有所見而口不能言而驚哭日夜哭上燈前  
後甚者其兩手虎口皆無脉紋面變五色

口口瘡重舌到乳上即啼身額微熱急以燈照非口瘡則舌腫  
所致

驚啼

驚啼者有陰陽二證亦有半陰半陽證陰則身軀溫涼大便黃綠時復驚啼陽則身軀發熱精神不定睡中驚畏由風冷乘之榮衛不調又有身涼大便赤黃而啼者有身熱大便青白啼者是半陰半陽之證也

夜啼

夜啼者有陰陽二證陰者臟冷也夜則陰盛與冷相搏冷與臟氣交繫故作痛而啼而啼者陽者臟熱夜則陽衰與熱相搏熱與臟氣交繫故作痛而啼又有冷熱之氣與胎毒攻衝亦食夜啼也

軀啼

軀啼者有陰陽二證陰者由母妊娠之時將養失度取涼飲冷

不避風寒冷氣入胞傷兒臟腑兒生之後胎寒腹內與正氣相搏令兒腹痛仰壅而啼其面白印堂黑大便青色是也陽者亦母妊娠之時酒食熱物衣厚火烘焙衾服熱氣入胞傷兒臟腑兒生之後胎熱腹內與正氣相搏令兒腹痛腹身而啼其證面赤印堂黃大便黃色是也又有兒出腹口中胎穢拭除不盡嘔下血穢停留臟腑亦是嬰啼也

盤腸氣壅啼

盤腸氣壅啼者母發時臨盆如蛇盤之狀漣漣有聲由乳母妊娠之時憂愁思慮勞役心氣蘊結不散觸入胎中致生之後胎氣怯弱被正氣相搏令兒腹痛其有陰陽二證陰則曲身而啼大便青沫陽則腰膝而斗大便青是二者皆乾啼無淚大便氣



胎熱伏心啼者由母妊娠之時恣食辛酸多味炙煖厚反焙服  
熱氣熏蒸觸入胎中致生之後熱伏於經令兒恍惚風邪暴傷  
令兒驚喘面赤紅時時啼叫是胎熱伏心故也

心腹痛啼

卒然心腹刺痛啼叫悶欲絕死者蓋小兒氣血軟弱精神不定  
忽傷賊風遭邪氣中寒皆虛而得之其證面易五色眼睛下  
視似驚癇狀是也無問大小若陰陽順理藥衛和平神守內堅  
邪不下正無諸暴疾也或腸胃挾冷暴爲寒邪所抑邪氣分爭  
攻衝上下亦令心腹刺痛而啼也

邪干心痛啼

邪干心痛啼者本非起於心即邪氣客於心主之經少陰者



火心也是五臟之王精神之舍心氣實則邪不干正心氣虛則邪傷於心傷於心則神去神去則死矣經曰真心痛且發夕死夕發旦死凡諸邪在心者止在心包脉絡是心之別脉也蓋兒稟受虛怯厥氣上逆痞而不散故發心痛而喘也

乳食作痛喘

乳食作痛喘者因而飲乳乳壅不散傷動脾胃脾胃氣弱不能消化滯乳停留與正氣交蒸欲成陣作痛而喘也

夜啼祟喘

面赤頭顙仰 狂啼夜不停 背中如火熱 邪燥蓄心經  
日上唇微紫 唇前惡祟噴 面青腰曲抖 三證細推尋  
小兒叫有三一則心搖邪燥面赤頭仰而抖名曰夜啼二則唇

前崇嘑啼目上視上唇牙微噤三則腰曲額汗而叫名曰驚  
腸

小兒生下有三啼 一一從頭爲說知 邪熱在心心內燥  
忽然驚哭則生悲 臟腑冷多陰氣作 或因觸犯惡神祇  
睡裏哭聲聲不歇 夜啼之候請君知  
夜啼四證驚爲一 無淚見燈心熱煩 面楚夾青臍下痛  
無時煩哭是神干

才出胎來便愛燈 白日無言任意眠 恰至黃昏生意嗟  
通宵啼叫到天明 休使師巫僥得法 莫言鬼魅及家先  
都緣只是心家熱 用藥涼肝爲解驚

邪祟所侵

湯氏曰目有所覩而驚哭

其證兩手虎口俱無脉紋而變五疳

萬金散 治嬰孩小兒臟冷夜啼

當歸去蘆 丁香 人參去蘆

五味子 乳香各三錢半 白朮

赤芍藥炒各半 分沉香一錢 桂心皮半錢

右側散用酒煎食後服

安神散 治嬰孩小兒一百二十日內夜啼

蟬蛻四十九箇其月後一歲除去前二截黃脚

右為極細末作四服用鈎藤煎湯調化不拘時候服

金鎖鎮心丹 治嬰孩小兒鎮心解熱退驚安神除煩燥止啼

全蝎七箇用薄荷包緩慢火炙乾 天麻煨

防風去蘆義 羌活去蘆 土黃

赤茯苓去皮 犀角 甘草炙各二錢

煅砂水飛錢 麝香半錢 金箔二十片

右爲極細末煉白蜜圓如皂角子大用薄荷煎湯不拘時候

調服

大聖寧心丹 治嬰孩小兒驚啼身軀溫涼大便青色

人參去蘆 山藥 龍齒煨

天麻煨 酸棗仁炒 白朮

茯神去皮水炒 甘草炙各二錢 朱砂水飛二錢

麝香半錢

方爲極細末用飯團如芡實大用麥門冬去心煮去移時煎湯研化不拘時候服

聚香圓

治嬰孩小兒夜間腹痛將臥而啼

乳香半錢

木香去蘆

丁香

沉香各二錢半

茴香炒

香附子去毛炒各二錢

甘草炙二錢

右爲極細末飯團如芡實大用紫蘇葉煎湯研化食遠服

沉香散

治嬰孩小兒驚風入腹內瀉壯熱肚疼并受胎氣怯

弱冷氣傷脾腹臌啼叫壯若鬼甚腹脹回青

沉香

木香

當歸去蘆

白朮

甘草炙

桂去皮

枳殼麥麩炒

五味子

赤芍藥去皮各半錢

右以咀用水酒各和同煎食前服

五味子散

治嬰孩小兒夜啼及腸痛至夜輒劇狀似鬼祟

五味子

當歸去蘆

赤芍藥去皮

白朮各五錢

茯神去皮

陳皮去白

桂去皮

甘草炙各二錢半

右剉散用水煎食前服

蟬花散

治嬰孩小兒夜啼不止狀若鬼祟

蟬蛻七箇下半截

右為極細末用薄荷煎湯入酒少許調食後服或者不信將  
土半截為末依前法服後啼如初古人之法實知其妙

花火膏

燈花 七箇

朱砂 一字

右研極細末用白蜜調兒睡抹唇內

楊氏方 蘇合香圓入雄黃末用降真香煎湯研化食後服

又方 用淡豆豉竈中土蚯蚓糞入醋杵搗和圓如雞卵大摩兒額上及手足心并臍上下各七次擘開有毛棄之

導赤散 小柴胡湯加 地黃 燈薪 麥門冬去心

竹茹

右咬咀用水煎不拘時候服

客忤

論曰小小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是

爲客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及父母或從外還  
衣服經履鬼神惡惡暴風或牛馬之氣皆爲忤也執作喘息乳  
氣未定者此爲客忤其乳母過醉及房勞喘後乳兒最劇能  
兒也不可不慎凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗易衣裝便回  
兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及聞馬鳴驚及馬上衣物馬  
氣皆令小兒中馬客忤慎護持之中一歲兒也小兒衣布帛綿  
中不得以頭髮履中亦爾白灰青帶青衣白帶皆令中忤凡非  
常人及諸物從外來亦能驚小兒致病欲防之法諸有從外來  
人及有異物入戶當將兒避之勿令見也若不避者燒尿令常  
有煙氣置戶前則善

小兒中客邪爲病者無時不有此病也而秋初一切小兒皆病



者豈是一切小兒寒中客邪小兒所以春夏少病秋夏多病秋  
夏小兒陽氣在外血脈嫩弱夏末秋初晨夕時有暴冷小兒最  
弱其外則易傷暴冷折其陽陽結則壯熱冒冷則下痢是故夏  
末秋初小兒多壯熱而下痢也未必皆是中客及魘也若治少  
小法夏末秋初常宜候天氣溫涼也有是寒卒冷者其少小則  
多患壯熱而下痢也慎不可先下之皆先緩盡後下之爾  
客作物忤中惡而變五色壯若驚瀉但目不上視

小兒忽見非常之物或見未識之人或雞鳴犬吠或見牛馬禽  
獸言戲驚熱或聞大聲因而作搐緣心氣虛精神離散當補  
心溫氣藥治不可妄用大寒之劑妄作驚風峻下忌成慢驚蓋  
精神未痊多得此證

客忤者小兒神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸而忤之其候  
口吐青黃白沫水穀鮮雜面色變易喘息腹滿及側癰癰壯似  
驚而但眼不上竅脉來弦急而數視其口中懸癰左右若有小  
小腫核即以竹針刺潰之或以瓜摘之治法辟邪正氣散驚定  
心延久則難為力也

小兒驚慄客忤乃累遭驚撲氣虛而作若見四肢疲憊不止面  
色黑目上視無光涎流不收牙噤氣冷此證不治

玄甲記云天下有女鳥名姑獲時後子母秘針作鳥獲一名天妃  
女一名隱飛鳥一名夜行游女又名針星鬼喜以陰雨夜過飛  
鳴徘徊人村里喚得來者是也鳥神無雄不產陰氣毒化生  
害落毛利於人中庭首見夜中便今日作癰病必死即化為其

兒也是以小兒生至十歲衣被不可露七八月尤忌

客忤吐沫客氣方云入房喘息未定便乳兒者則成客忤殺小兒

客忤畏生人 或衝鬼共神 吐黃青白沫 驚悸黑紅新

眼白睛垂下 唇青色變類 甚傷淫帶乳 腹痛命遂迷

累累連驚恐 心虛膽橫憂 額青浮碧色 津液出唇流

口上牙微噤 胃翻似有蛔 安神無正胃 早治自然瘳

物觸

人抵小兒隨其心性不可觸逆凡有所愛之物不可強直取之  
蓋小兒而脾必執着若不及所欲心神亂解神逐物散必不食  
不言神昏如醉四肢垂暈壯若諸惡證醫士見之莫知所措如  
有是證詢問乳母及左右看者順從所欲然後用藥則安也

沉香順氣散

治嬰孩小兒物觸

沉香

茯神去灰水

紫蘇葉

人參去蘆

甘草炙各一錢

右藥極細末用紫蘇葉煎湯調化不拘時候服

白虎

小兒有白虎一病不可不察也據統天曆遊年圖云白虎在太歲後一辰也假如太歲在巳則白虎在辰太歲在申則白虎在未餘皆倣此惟其神在方小兒不知禁忌出入居處稍有觸冒便能為病其狀身微熱有時小冷有時微汗屈指如數物手足不瘳癢者是也

葉香散

治嬰孩小兒白虎病

降真香

沉香

乳香

檀香

安息香

人參去蘆

茯神去木

甘草炙

酸棗仁去核

右咬咀用水煎入麝香一字調不拘時候服存藥滓房內燒

尸蛇

小兒尸疰者壯若驚癇而後拋紅赤腫里突如大人傳尸之患  
或胎中而受或相傳而得若見偏搐唇眼俱顫滿頭赤腫不治  
或因胎受或相傳有似驚風項仰翻後拋忽生唇赤腫  
痰潮面臉色如蠶時時目上加乾澀旋旋風拘齒禁關  
偏搐額青唇眼顫徒勞用藥保生全

中惡

中惡者卒然心腹刺痛悶絕煩死腹大而滿

其脉緊細而微者生 緊大而浮者死

蘇合香圓 研雄黃麝香用降真香煎湯研化食遠服

阮氏千金湯 治嬰孩小兒暴驚卒死中惡

蜀漆炒二錢半 左顧牡蠣一錢一分

右剉散用漿水煎不拘時候服

卒死

阮氏曰中惡論曰凡人志弱心虛精神失守片犯邪惡令人心

腹暴痛悶亂如死

卒忤者蓋陰陽否隔氣道厥逆上下不通陽氣散亂故不知人

氣還則生不還則死

三虛之中

三虛者乘年之衰逢月之空失時之和致賊風鬼邪之氣乘虛而入致令陰氣偏竭於內陽氣阻隔於外二氣壅遏不得升降而蒸絕也氣絕則復活

乘年逢月失時和

此是三虛被鬼魔

賊氣中心見蒸死

陰陽未絕免沉痾

乘年衰逢月空

失時和者三虛中

遇賊風号還卒死

急須救治莫匆匆

破棺散

治魔死縊死溺死惡死五絕若心頭暖者可治

魏夫人方傳于世出

孫真人備急仙方世人纔見一轉氣絕便以爲死不知有可救

之方

半夏去臍皮研極細生末量大小或一字吹入鼻內

或用水調塞鼻內一方用皂角極細末吹入鼻內

華佗真人方

雄黃水飛研極細末用桃樹枝煎湯灌

五硬

仰頭取氣動搖難

氣逆痰連胸膈間

脈手心如冰冷硬

頭仰為風命不還

硬氣築心

熱極則生寒

都緣氣少寬

腹中交刺痛

連胸湊心疼

面白青仍白

唇焦似死肝

更加頻喘噎

難保命完全

五軟

錢氏論五軟證名曰胎怯良由父母精不足母血氣衰而得誠哉



是言以遇之有因母血海之冷用滋強補而早者有受胎而所  
多疾者或其父好色貪酒氣賦虛弱或年事已邁而後見子有  
日月不足而生者或服墮胎之劑不去而竟成孕者徒爾耗傷  
真氣苟或有生譬諸陰地淺土之草雖有發生而暢茂者少又  
如培植樹木動搖其根而成者鮮矣由是論之嬰孩怯弱不耐  
寒暑縱使成人亦多有疾矣自降生之後精氣不充筋骨痿弱  
肌肉虛瘦神色昏慢才為六淫所侵便致頭項手足身軟名五  
軟畏藥不效亦為癰人犯此惡證難治

頭因不舉 項軟難收 腎肝之病 發不能休

四肢無力 腳手皆垂 脾風之候 尚可用醫

喫食不長 肉少脾寬 瀉痢交作 醫治却難

五歲後兒 脚弱虛羸 尚可榮氣 進地黃圓

虛舌出口 太過盛陽 宜先治腦 唇青必亡

稟賦元虛弱不克 六淫之氣易來攻 頭無手足身羸弱

世證名爲五軟同

### 驚後肢軟

慢驚雖差後 神思一如癡 不語因痰滯 須防軟四肢

### 項頸軟倒

面紅髮豎唇無色 項軟如綿無氣力 肺膈邪毒在肝源

乳食昏昏全不喫 四肢垂躄頭先倒 膽熱肝衰眼青碧

疎風調氣補肝脾 筋緩項舒要尋識

纔傾天柱道難醫 算得源由心脾 此息却須先吐瀉

更熱又病瘦凡羸 或傷氣脉偏無汗 妙藥醫之定已遲  
至此忽然成大患 又無不變四肢肥 難擡項軟頭如石  
面赤唇紅臉似緋 此患只緣陽勝熱 後來肝熱又相隨  
肝經風熱偏天柱 請用消涼藥退之 熱藥貼時筋項煖  
安和功效不須疑

小兒臁肥容壯不為瘦瘠忽然項軟頭倒此名下窳皆因肝腎  
氣虛客邪侵襲風肝傳於筋骨故成斯疾蓋肝主筋腎主骨  
骨筋骨俱弱則項軟垂下無力又名天柱倒與五軟相類不遠

### 天柱骨倒

天柱骨倒者有三種有吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱面赤  
唇紅忽變青者有傷寒不及發表成者是皆風邪入肝以致筋

絡舒弛吐瀉者當調胃氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼  
項痛傷寒天柱骨倒者難療調治之法將何擇焉  
天柱骨倒為心寒所得元因生瀉類肝受賊風難俯仰  
脾傷必氣損精神頭重頸軟身重脊痛筋緩皮寬項不伸  
面色痿黃胃腹脹渴多異食命遂絕  
忽狀天柱倒何如此病皆因肝腎虛外有風邪容易襲  
故傳項軟不相隨  
貼項取

附子去皮鹽酒浸天商星去毒

石為極細末用生薑汁調爛貼項處服滿青圓

熱

小兒生稟純陽血氣壅實五臟易生熱也夫肝熱則潮眼赤痛  
流淚羞明或生翳障心熱則口內生瘡小便赤腫淋瀝不通肺  
熱則鼻衄不止大腑秘結脾熱則多有涎沫口內長流心脾熱  
則生重舌及木舌胃熱則口氣作臭腎熱則耳聾或出膿水注  
至於五臟蘊蓄風熱毒氣則面赤如緋五心煩熱四肢溫壯  
痰涎壅盛目流多淚若上衝咽喉則與氣血相搏結聚壅塞  
而成喉閉顯腫二證危在頃刻也五臟所主熱各不同其治也  
亦不同是不可一槩論也又小兒心肺有熱因當風解脫風邪  
傷於皮毛入於臟腑則今惡風壯熱胸膈煩悶目澁頭昏或時  
面青胃之風熱又有小兒面赤頭痛唇焦咽痛舌腫目赤煩下  
結破口內生瘡痰實不利涕唾稠粘睡卧不安譫語狂妄謂之

臨熱又有小兒在胎之時因母服熱藥過多或食糟酒炙博滯  
熱等物是諸熱毒傳入於胎中兒生之後身熱黃赤兩眼不開  
通證治之凡病熱者作呻吟面赤身熱啼叫不止口熱如湯或  
生瘡疥之胎熱隨證治之凡病熱者切不可飲酒有大熱毒  
不戒則損新救火雖賸敗之藥終於罔功若尚食炒須乳母同  
忌

楊氏曰小兒有病惟熱最難明理論曰發熱者怫怫然發於皮  
膚之間焮焮然散而成熱也輕重不同有所謂翕翕發熱者若  
合羽所覆明其熱在外屬表乃風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致  
宜發汗而散之所謂蒸蒸發熱者謂若薰蒸之蒸明其熱在內  
屬裏乃陽氣下陷而入陰中也法當攻下以絳之表證未罷邪

氣傳裏裏未作實是爲半表半裏之間則表裏俱發熱而熱又  
輕於純在表也發熱惡寒又於陽也無熱惡寒發於陰也楊氏  
曰陽明裏實熱盛當攻之以寒太陽風寒外搏陰盛惡寒雖然  
左慈論云少陽氣加解離極小柴胡湯如微熱不渴又當加桂  
明也論云發熱惡寒之常經云脈陰陽俱平熱不止及下利發  
熱者二便後利者下利燥屎不爲表汗狂言不能食者陰陽交此  
皆不治之證

小兒熱證古分三種然例有驚風熱風熱潮熱傷寒熱泄熱  
積熱止熱陰熱熱餘毒熱十種熱證病各不同已有編類而作  
別類者以括括也類近積熱證先腹肚熱脚冷者是傷寒熱  
同積熱亦相類且復兼有二種皆從表發入裏且治證隨五

諸證皆有之復過輕重類諸證而調解不可越前病用藥如傷  
 寒後有餘毒熱即於傷寒調理不及而解餘皆倣之大概驚風  
 涼之風熱化之疳熱補之朝熱散之傷寒熱解之瘧熱分之積  
 熱利之丹熱消之瘧熱順氣之諸證餘熱皆和之此埋雖  
 大藥如是言畢竟用之有理乃爲醫士善學設有不遵其新斯  
 可謂之昏見也





發大癰癰潰即墮壞皮膚十死一生何堪忍見初生幼幼毒氣  
加盛肌肉柔弱委和托裏拘攣扶肌拘攣地骨皮是驚節黃葉常與  
清心平調血脈慎其口又抱令緩醫士順理與扶其危

衛熱

小兒在胎中母和氣飢飽勞役神疲力倦多矣其有不勞役  
者即有憂愁田心胎臟兒乃思入胎臟兒乃思  
思不穩狂啼心正醫平調  
胎既正熱自散止

辨法

證

小兒發熱

用度者謂之驚熱世呼為潮熱

小兒發熱形瘦多渴喫食不長肌肉者謂之疳熱

小兒發熱煩叫不時面青者謂之風熱

小兒發熱日中可夜間熱其天明復涼謂之傷寒餘熱失解

小兒發熱嗜覺煩叫無時通身熱渴謂之積熱

小兒諸病惟熱最多先當辯其虛實隨證治之

小兒病熱者在脇先赤肝受熱也右脇先赤肺受熱也額上无

赤心受熱也頤間先赤腎受熱也鼻上无赤脾受熱也

主熱各不同其治也亦不同是不可一藥而論大抵熱則生風

風生則悸矣

潮熱發歇有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發旦止餘熱寒邪未盡

食熱壯背先熱疳熱骨蒸盜汗出一向不止煩熱心燥不安積

熱煩赤口瘡風熱汗出身熱瘧熱困倦少力客熱來去不定癰  
熱涎嗽飲水寒熱發如瘧壯血熱反已發熱癰熱耳鼻大冷諸  
熱得之各有所歸其間二三證交互者宜隨其輕重而治

虛熱

其證面色青白身微熱溫冷口氣冷手足心不足大小便  
自利恍惚神慢虛氣軟弱泄瀉多尿虛汗自出

叔和曰虛熱不可太攻熱去則寒起

惺惺散

四君子湯

錢氏白朮散

實熱

其證面赤氣盛口熱煩渴唇腫大便難掀揭衣被煩渴暴

時

在裏宜汗

青龍湯

解肌湯加麻黃

在裏宜下

四順飲

解肌湯加大黃

孫書人曰得利謹勿中補熱氣得補復作

表裏俱熱舉按脈實面黃頰赤唇燥口乾小便赤澀大便  
堅硬口中熱氣

四順飲加川芎藭惺惺散加麻黃大黃

青龍湯

解肌湯加大黃黃芩麻黃薑金

冷熱不調

其論身體重汗下溫下利者熱上盛下泄水穀不分

敗毒散加木香 解肌湯加桂木香

汗下熱不除

二熱下裏熱宜微汗退裏熱宜微下汗下而熱入再下乃表  
裏俱虛氣不歸元陽浮於外不可再用涼藥及再汗下當和胃  
氣使陽氣斂歸內其熱自止

參苓白朮散 實脾散

三熱舉口若以經汗下大熱未除恐防瘵瘵不可妄用涼藥

餘熱不除

三陽日用涼藥不可十分盡用蓋熱去則寒起古人戒之或餘  
熱不除不足關心也

川芎

茯苓 去皮

甘草 炙

白朮

右制散用水煎食遠服和胃氣收斂浮陽

又曰壯熱煩燥已用柴胡黃芩大黃解利之其熱平熱無進已

黃連黃芩瀉心川芎湯

赤茯苓大皮利小便

地黃湯

右劉散用燈心一捻用水煎食遠服心血一調其熱自退

寒熱往來

明理論曰陽盛則熱陰盛則寒乃陰陽相勝也寒為陰熱為陽  
裏為陰表為陽邪克於表與陽爭則為寒邪入於裏則陰爭則  
為熱邪在半表半裏外與陽爭為寒內與陰爭為熱邪在半表  
半裏則實熱亦半矣審其熱多少知其表裏邪之氣淺深小柴  
胡湯主之內經曰熱淫於內以苦發之必先散熱以苦寒為主  
柴胡為君黃芩為臣以成微熱發表之劑人參味甘平邪氣傳

裏甘以緩之人參甘草爲佐以扶正氣半夏味苦辛微溫邪入  
初裏辛以散之以三味佐柴胡和表生薑味辛溫大棗味甘溫  
經曰辛能發散是以生薑大棗爲使和柴胡以和表七味相合  
兩解之劑則當矣仁齋曰此藥非獨和解表裏大能解血熱消  
惡血蓋傷寒一二日調治失宜必致傷血此藥內有黃芩柴胡  
最能行血但藥性差涼宜以寒熱輕重用藥溫涼加減得法本  
方解肌湯內此方藥味俱味俱用詳審用之母爲熱過冷誤乃  
良心也

邪熱在少陰

湯氏曰本臟受火後爲熱所乘故炎上而焦矣

其證面紅小便赤口氣熱喘時有汗仰身煩煩燥畏燈火



小朱胡湯加生地黃、桑葉、麥門冬、竹茹、同煎不拘時服

積熱在內

王氏曰小兒內外蘊積熱氣非食積熱也失治則發斑丹毒咽  
喉等疾

楊氏曰內因酒麵煎燂熱毒熱藥峻補外因被火暖爐火侵逼  
皆能生熱所謂積熱者朝斯夕斯內外久積熱氣三黃圓第一  
熱熱出於心熱感則傷血

三黃圓 治嬰孩小兒解三焦積熱

黃連去髮炒 黃芩下炒 大黃紙煨各半錢

右爲極細末煉白蜜圓如皂子大用白湯研化食前服

四順飲 治嬰孩小兒血脈壅實臟腑生熱頰赤多渴五心煩

燥睡卧不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失理令兒血氣不和腸胃不調或溫壯連滯或壯熱不歇欲發驚癇并積潮熱瘡疳發熱并解痘毒及痘毒痘後眼赤翳障身疼癰腫須加川芎增損方法隨方用尋常只用本方又治風熱結核頭面生瘡瘡目赤咽痛壅滯

當歸肺骨多熱多驚云蘆大黃蒸三次小便赤少大便多熱

甘草熱則生寒多泄多痰赤芍藥熱則生寒小便赤各錢

或咀用水煎食前服本草云治時行發熱瘧川大黃微炒

加柴胡

傷風熱

方曰由乳母不能謹護風池早解脫當風致風邪入於

膚達於腠理今兒身寒清涕發熱惡風頭腫向光煩燥乃傷風  
衛氣故表虛自汗法當解肌不可用麻黃汗之則發瘧

解肌湯

敗毒散

人參羌活散

惺惺散

玉餅子

金生圓

夜間遍體熱如湯 繞到天明似舊涼 不欠鬼神為禍祟

口綠脾臟受風傷 先宜解表退熱散 後用藜蘆瀉大腸

此證還須調五臟 安和脾胃自身康

風熱熱

得志風痰熱 晚熱早還涼 呔水無時度 啗飯食如常

日夜多啼叫 喘急豈為昌 患宜煩集藥 莫待眼翻張

頭熱脚冷氣不和 漸生氣喘喘脈多 夢裏自驚手足掣

除熱消痰不作癰

湯氏曰乃發作痰而生風也實者利之

金匱圓

白圓子

玉餅子

人參羌活散加 荆芥穗

惺惺散加 防風 荆芥穗 麻黃赤節

麻痘熱

行麻痘熱 中指冷如冰 目澁常如睡 乳食不消聞

耳冷眼中赤 麻痘出將呈 或時寒熱起 困亂是心情

驚風熱

兒患驚風熱 驚啼汗出多 囊青無兒乳 兩眼慢雲和

咬乳流涎出 脾冷病纏痼 若逢眼仰視 早宜艾透肚

疳熱

此證疳為熱

鼻赤齒頰燥

乳食常無飽

頭瘡髮焦

泥炭強如飯

肌膚不寧膏

五心煩熱盛

有積是疳

潮熱

因疾未安和

潮熱早晚過

體虛并氣弱

調理宜謹此

日久加驚悸

脾邪因熱多

面腮唇色絕

厥逆已沉痾

發熱

發熱頻頻

氣積因飭未退除

煩赤口乾多發哭

不食熱實氣熱

消風散

治嬰孩小兒因解脫風邪傷於皮毛入於臟腑則令

惡風壯熱曾服有延目流多睡虛風神慢驚熱

荆芥穗

甘草炙

芫花

羌活去蘆

僵蠶去嘴絲

防風去蘆叉

茯苓去皮

蟬蛻炒去土

藿香葉

人參去蘆各二兩厚朴去蘆薑製炒陳皮去白各二錢半

右為極細末用茶清或乳香煎湯調化不拘時候服

瀉黃散

治嬰孩小兒身體蒸熱胃腸煩滿皮膚如瘡痛之者

白睛亦然濕熱所致也

黃連去蘆

茵陳各五分

黃蘗

黃芩各四分

梔子去殼

茯苓去皮

澤瀉各三分

右以咀用水煎食前服

壯熱

巢氏曰乃熱氣盛薰發於外故令身熱壯熱其發人體肥壯相似小有異者熱加其膏

六合湯 治嬰孩小兒血熱無日已午間發熱過晚則涼

當歸去蘆

大黃煨

川芎

地黃蒸

白芍藥炒

柴胡 五錢各五錢

右剉散用水煎食前服

一方加桂二錢

火府散 治嬰孩小兒面赤咬牙發熱唇乾燥小便赤澀邪熱

地黃

木通 去蘆各五錢 黃芩

甘草炙各二錢半

右咬咀用水煎食前服入竹葉五錢

溫壯熱

湯氏曰由臟腑不調內有伏熱則大便黃而臭內夾宿冷則大  
便白而酸氣皆冷熱搏於胃氣致令不和無氣壅滯故綿積體  
熱服 惺惺散

養活散

內有伏熱服

五苓散

白虎湯

內有宿寒服

理中湯

紫蘇散

治嬰孩小兒溫壯伏熱來去

柴胡去蘆三錢半 麥門冬三錢

人參三錢

赤茯苓三錢

甘草三錢半

黃芩五錢

右剉散用水煎入小麥二十粒竹葉二皮

時氣熱



巢氏曰感冒四時不正之氣頭痛壯熱與傷寒相似但二時所  
行之證人人相似故曰時氣  
太一十神湯

陳皮去白

紫蘇

川芎

赤芍藥之

葛根去皮

香附子去蘖

麻黃去節

白芷

甘草炙

升麻

右以咀用生薑三斤棗一箇去核同煎不拘時候服未受證  
者加大黃研碎黃同煎服以解疫毒熱毒之氣

時氣傳變

時氣因邪觸

春秋及夏冬

受邪則肉內

傷發衛榮中

頭熱身熱 心煩兩頰紅 鼻清涎嗽嚏 傳變似傷風

夜熱身涼

夜熱身如火 纔明依舊涼 非干邪氣作 蓋為寒風傷

汗熱身多赤 脾蒸胃帶黃 汗來方始退 肌體漸羸肥

頭熱身涼

頭熱身涼 陰虧不順陽 陰沈陽不降 病作必為殃

頭熱頭痛

諸陽傷腦戶 熱病只攻頭 陰被陽相隔 榮行衛不流

久熱筋疼

久熱傷筋骨 伸舒痛若風 亦能成軟弱 氣血不能通

久熱頭暈

久熱生煩暈 心虛臥不寧 骨蒸微汗 憔悴減容形

風熱相競

風熱互相競 風變不自由 疼牽腰脊間 痛引熱攻頭

諸熱通治

身中有熱先除熱 熱裏逢虛先補虛

一粒金丹 治嬰孩小兒五臟溫熱曾 煩煩口渴多渴面赤

頭眩目赤咽痛舌煩生瘡痰涎壅盛五心煩熱四肢溫壯小便

黃赤

人參去蘆

犀角

防風去蘆義

琥珀

玳瑁各錢

茯苓去皮

寒水石煨

甘草炙各錢

龍腦

朱砂水飛各二錢麝香半錢

金箔二十五片

右為極細末用杭米糊圓如芡實大金箔為衣用麥門冬去心煎湯或薄荷煎湯研化不拘時候服

清涼飲子

治小兒血氣壅盛臟腑生熱煩赤多涕五心

煩熱咽喉閉痛乳

哺不時寒溫失度潮熱往來睡卧不安手足

振掉欲生風候

人參二錢

川芎各二錢

防風去蘆艾

當歸尾炒

赤芍藥炒

大黃麵裹煨

甘草炙各二錢

右咬咀入燈籠

七葉麥門冬去心七粒同煎不拘時候服

健胃湯

治小兒

小兒積熱心驚小便赤腫口内生瘡

梔子仁

木通七皮節

當歸尾炒

白芷各錢

防風五錢

甘草炙各錢

右為極細末用地黃麥門冬各六分同煎湯調不拘時候服

有吐瀉後生口瘡乃名冒絕甘心熱宜用四陽之藥

生犀圓 治嬰孩小兒解散風熱清心肺利咽膈

犀角

真珠

防風去蘆又

羌活去蘆

天竺黃

茯神去皮木各三錢

太黃煨

甘草炙各三錢

朱砂水飛錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化入麥門

冬去心不煎時候服冬至後立春前宜服

暑

聖惠曰由乳母福昌暑熱乳乳兒及小兒口中淫熱受熱成疾  
楊氏曰人心包絡與胃口相應或因胃暑是毒自口鼻中入凝  
於牙頰達於心包絡凡暑天過中胃熱常以凉水漱口勿熱飲吐之去暑毒  
蓋暑之入人也伏於二焦腸胃之間至於無節累月而不可測  
識或為霍亂吐痢為中滿為瘧疾為大渴為腹脹為下血為諸  
熱等疾若因暑得之其根未除雖百藥遍置難收其效無傷暑  
雖似傷寒但暑能消氣氣消則脉散虛而無力或六脉沉緩  
微弱

其證面垢唇慄毛聳惡寒吐痢煩燥渴其壯如傷虎身熱  
頭疼或四肢厥冷但身熱無汗

醫氏曰治法宜早壓暑和胃用藥不可過冷若冷藥過度胃寒

停水潮熱而嘔或身熱微煩則湧浮於外宜小半夏湯若飲水過多或傷冷藥吐痢不食自痢不渴此外熱裏寒宜理中湯若脈虛而黑冷汗手足微寒發渴口氣熱乃裏熱之證不可誤投熱藥如抱薪救焚不發黃則發狂矣

阮石峯曰暑大忽有老幼昏悶不醒手足搐掣或角弓反張壯如驚風或吐衄身熱如火乃伏暑不熱感風邪宜服枇杷葉散若倉卒無藥以枇杷葉火燎去毛搗碎西瓜汁濾去滓灌即醒

王氏曰夏秋之間小兒發熱傷風傷寒等證乃先受暑毒而後風邪繼先解暑次則解表發散若不先去暑毒定傳瘧疾日久難瘥矣

小兒伏暑者蓋緣脾胃虛弱腠理開疎暑氣乘虛而入故也大

抵夏月間小兒最要調理脾胃之和則風暑不侵矣夫暑者在天爲熱在地爲火在人爲心是以暑氣侵人必先傷暑而後傷風者其候身熱潮熱晝夜不歇若三四日潮熱全退者是暑入心蒙蔽心竅則合手足搐搦不醒人事此名暑風證也若身直不醒則成痙證難治自古至今暑風一證醫書之所不載但診其脈浮而虛者是也蓋浮則爲風虛則爲暑此證若以驚風治之必不救若只伏暑無傷風證者其候頭額溫五心熱小便赤而少面伏地卧或有只吐而不瀉或有只瀉而不吐者或有吐瀉俱作者又有年長成童在道途間爲暑風所干煩悶而不醒人事者急扶在陰涼處切不可便與冷水并卧濕地若與冷水即與暑氣相繫危矣反掌當以布帛蘸微湯熱熨臍傷



間續以布帛帕頭放臍腹上用湯氈盛熱湯淋怕令臍腹濕熱  
候漸甦醒方可用米飲徐徐灌之然後用藥解其暑毒必平復  
伏暑生驚

伏熱生涎燥 多嘔見食悲 向明憎不樂 入暗稍相宜  
或即鮮雙目 無時動四肢 渴煩尋冷地 暑毒作驚危  
中暑似驚

暑毒傷心壯若驚 頭疼渴熱燥無聲 昏沉喘噦延無汗  
手足抽掣眼闔睛

### 吐瀉因暑

吐瀉因傷暑 腸鳴利色黃 扁鵲云傷暑吐瀉腸鳴便黃水久則  
青阜千金云寒則腸中泄瀉腸滿痛入云腸虛則腸知虛鳴瀉黃白泄食

不消化脘腹脹痛也 渴多煩不食 尿少熱如湯 困頓精神便

嘔煎意思荒 氣虛煩腸痛 而色減精光

去桂五苓散 治嬰孩小兒伏暑作渴

猪苓去皮

白朮

外茯苓去皮各五錢

澤瀉七錢半

右爲極細末用車前草燈薪同煎湯調不拘時候服

一方加羌活 鎮心加朱砂 吐不止加生薑自然汁

渴盛加人參

異功圓 五苓散加人參爲極細末煉白蜜圓如芡實大朱砂

爲灰小兒煩渴用燈薪竹葉同煎湯研化食前服

衛生之家修合常服以解暑毒

二頭散 治嬰孩小兒渴瀉煩嗽五苓散加杏仁去皮尖

甘草炙

右為極細末用片水調食前服虛者白湯調服

六和湯 治嬰孩小兒中暑霍亂吐瀉爛渴痰嗽

人參去蘆 縮砂去殼 甘草炙

杏仁去皮尖 半夏湯浸去鹽各五錢

扁豆薑製炒 赤茯苓去皮 藿香葉

木瓜各一兩 香薷葉 厚朴薑製各二兩

右剉散用生薑二片棗一箇去核同煎食前服

小半夏湯 治嬰孩小兒嘔吐風痰水飲

半夏薑製五錢 茯苓去皮三錢

右吹咀入薑汁同水煎不拘時服

清肺飲子 治嬰孩小兒伏暑嘔吐煩渴五心熱小便赤少面

伏地卧

香薷

茯苓上皮各三錢淡竹葉

人參去蘆

半夏麴

檀香各二錢

甘草炙二錢

粳米五錢

方吹咀用生薑三片棗一箇去核同煎食遠沉冷服

二生圓

治嬰孩小兒暑毒入心痰塞心竅昏困迷悶不能言

語捕翳

天南星去皮脐半夏去脐

白附子

右各生用為極細末猪膽汁糊圓如黍米大曬乾用薄荷煎

不拘時候服後可令小兒側卧甚嘔出痰水即醒蓋此乃  
危急之證若非生料藥膜貼之劑不足以代病也幸毋忽

### 濕

巢氏病源曰濕者水濕之蒸氣也活人書云風雨襲虛山澤蒸  
氣豈止大人中濕小兒亦有受證者緣小兒入夏以來脾胃虛  
弱腠理開疎或因連日雨作或地上蒸濕小兒坐卧便濕氣或  
乳母抱在陰濕地上嬉戲下覺稍久亦失濕氣夫受濕者其脉  
沉緩濕流關節身軀煩疼發熱惡寒或多汗惡風精神昏悶或  
小便不利大腑滯泄若經久不除則手足垂痺若入臟則瘖啞  
不言挾風者為煩熱為流走為拘急兼寒者為痛為浮為腫與  
風寒二氣相合則為痺痛此皆先受濕後挾風寒之氣而然也

大抵治濕之法不可發汗亦不可向猛火處只當踈利小腑其  
濕自去不利小腑病根不除流連歲月是養虛遺患也  
參朮散 治嬰孩小兒初受濕氣身麻痠痛發熱惡風多汗回  
浮作嘔小便不利

人參去蘆

猪苓去皮

乾薑炮

白朮各一錢

澤瀉

木通去皮節

赤茯苓去皮各三錢

右咬咀入燈薪七葉車前草

一拾用水同煎食前服

除濕湯

治嬰孩小兒助脾

去濕氣傷筋手足軟弱吐瀉

提舉疼痛

人參去蘆

橘

香

薤白葉

蒼朮水清炒沙大腹皮

淡芩六分

厚朴薑製分

生薑薑汁製去麝白水

甘草炙各二錢

右咬咀用水煎不拘時服

傷風

食睡口中氣熱呵欠頻悶常發惡心解不散有下證當下大飲水  
不止而善食者可微下餘不可下也

傷風手足冷

脾臟桂枝湯和脾後發散如解

傷風自利

脾臟虛桂枝湯補脾後發散亦在調中有下證後服溫驚圓

傷風腹脹

脾臟虛當補脾必不喘後發散仍補脾去脹用藹氣圓

傷風蕪蕪

蕪心則驚悸蕪肺則喘喘意硬氣長出氣散蕪腎則畏明冬  
隨補母臟虛見故也

傷風下後餘熱

以藥下之大過胃中虛熱飲水無力也當生胃中津液多腹自  
散

傷風吐瀉身溫

下利下熱腹多氣脹大便黃白色嘔吐乳食不消時時發熱更有  
五臟無見證當煎入臟君臣藥如先曾下或無下證慎不可下



也吐脾肺受寒不能入食也

傷風吐瀉身熱

多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃赤此爲胃虛熱渴吐瀉也  
當生胃中津液以止其渴止後用益散藥止渴多服白水散發  
散藥主之

傷風吐瀉身涼

吐沫瀉青白色悶亂不渴哽氣長出氣睡露睛此傷在毒輕怯  
因成吐瀉當補脾後發散此二證多病於春冬也

風溫潮熱壯熱相似

潮熱者時間發熱過時即退來日依時發熱此欲發驚也壯熱  
者一向熱而不已甚則發驚瀉也風熱者身熱而口中氣熱有

風證溫壯者但溫而不熱也

### 咳嗽

芽兒及嬰兒咳嗽難治之者蓋為初生血氣微弱五臟未充肌體未固應變未周之兒所感寒邪攻及腠理表裏相干邪正相勝陰陽未合不可強生攻治妄吐妄下妄汗妄補皆令兒病轉盛不惟無益甚有傷害幼幼咳嗽乳母之過圓故狼虎醫士之罪豈特芽兒及嬰兒難為調理應小兒有患咳嗽未敢輕許一服藥便見安樂雖傷寒傷風證候已歸平復且咳嗽尚作大抵究竟小兒咳嗽先看有無熱證痰有熱有表無熱傳過或是未傳近則未傳久則傳過痰稠熱盛痰壅即吐宜服補肺散服之自然痰化熱散咳嗽漸愈未可使用滋藥白礬天南星石

養雖未砒粉之類宜先滋潤脾肺痰用王氏金華散少少時時  
與服凡兒咳嗽須究表裏未可一向攻嗽若用金石藥直入胃  
院乃成慢脾風候手足勾曲又何所苦已可輕粉砒藥下之腸  
胃不禁須更成風亦何所宜只用溫平與表順助其氣滋潤肺  
經和順三焦其痰漸化其熱自退不必攻繫所謂理嗽且宜補  
氣化痰蓋肺生胃門氣壯即嗽漸減胃止即痰不生肺滋即嗽  
不有在乳母當忌食稍長久用安存避風回滋忌毒慎冷然小  
兒氣弱其嗽作熱用藥調理實不因爾又有時氣咳嗽謂其天  
時令熱不調幼幼虛怯受患者療其嗽日夜不輟或吐或喘痰  
熱壅盛至重者利之即愈謂用大黃朴硝枳實陳皮半夏人參  
厚朴柴胡心神煩悶胃膈不快方宜與服無熱與痰亦不可下

伏請鑑辨毋致得失

咳嗽屬肺經所主肺主氣外屬皮毛腠理凡牙兒嬰兒日夜切與保持無令風吹腦顛背膝致使肺受寒邪咳嗽不已作甚多痰若被風吹即日感受次第傳之五臟虛處即任所入蓋初生兒氣微易得傳變最由顛動五臟有傷和氣五臟不和二焦不順故有傳變是以我生於二肝木也肝主風顛癇眼日克我即二心火也心主驚恐悸頑疳血脉腫臉其嗽傳受或吐逆或痰涎或厥冷或惡悸至眼目兩眶黑紫如被物傷成重發癇古人之久嗽成癇謂藥力不及候已傳過難以療理預當告之

巢氏病源曰小兒嗽者由風傷於肺也五臟之中肺臟軟弱若有疾病必難調治肺主氣候皮毛肺腧穴在背上小兒血氣未

年壯時之際不避風寒則風寒傷於皮毛因從肺喻元而入即  
嗽矣小兒須當令背脊暖實月亦須用背心之類若背脊冷得嗽月  
內嬰兒百中救一百日內嗽者十中可一而全也大抵嗽證惟  
七八月間肺氣大旺病者必實其證面赤身熱痰涎壅盛睡臥  
不得治法當以下之如久則不可下若嗽而硬氣口內特特出  
氣候中有聲此則久病肺虛之證久嗽者肺經津液惟欬久花  
五錢手湯人參阿膠散主之亦有嗽而咯膿血者乃肺熱盛也  
合用人參清肺飲二和湯加白茅根同煎食後服至於嗽逆者  
由喘氣未定因而飲乳乳與氣相逆氣則飲乳射於肺故咳而  
氣逆胃之咳逆杏蘇飲主之有嗽而喘不出由客風傷於肺管  
吸門也肺主聲音紫苑膏柴杏湯主之又有寒嗽熱嗽驚於嗽

寒嗽者由風冷入肺也其證面青氣逆咳嗽喘急晝夜不息人參寧肺湯主之熱嗽者乃肺經蘊熱其證氣熱喘滿甚則開亂不食飲水不止清肺飲子主之麝香嗽者由膏膈痰多痰與氣相繫隨嗽動息所以麝香有聲也七寶散真珠圓主之治嗽之法熱即下之冷即溫之更隨虛實以意加減却不可泥古反成大害若久嗽不已至傷真氣亦生驚風誠非小疾急宜治之咳嗽謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而爲痰也咳嗽是有痰而有聲蓋因傷於肺氣而咳動於脾濕因咳而爲嗽也

明理論曰咳者聲咳之咳俗謂之嗽肺主氣形寒飲冷則傷肺使氣上而不下逆而妄收衝繫咽不通也嗝逆症如拜習習如

便而咳也。甚者連連續續不止，坐臥不安，引動百骸，謂于外矣。皮毛者，肺之合也。皮毛受寒氣，從其合內外邪客而發也。楊氏曰：肺爲嬌臟，外主一身之皮毛，內爲五臟之華蓋。形寒飲冷，最易得寒，燥氣鬱蒸，最易爲熱。惟其易爲冷熱，而成咳嗽痰壅，胃院氣逆，不下衝氣動肺，與夫肺實肺虛，皆能壅痰而發嗽也。

其證感風者，鼻息壅聲重，停寒淒清，怯寒挾熱，則焦煩受濕，爲纏滯瘀血，則肺間腥悶，停水則心怔忡，或實或虛，痰又之黃白唾之稀稠，可知也。

治嗽之法，肺脉浮爲風邪所客，宜發散之。肺脉實爲氣壅內熱，而清利行之。肺脉濡散爲肺虛，宜補肺以安之。其間久嗽曾解

利以致肺胃虛寒飲食不進則中溫中助胃加以和平治嗽之劑然諸風諸痰咳嗽之類雖用枳殼爲佐此藥獨不寬中最能行氣氣下則痰下肺證自平矣

小兒一時中風熱喘急息脈緩者生脈急者死莫作痰喘治審得病之源人之驕病

傷風發熱咳嗽者宜先發散其表人參薤白散加蘇黃或金沸草散加桑根白皮惺惺散參蘇飲皆是發散之藥然不除解肌湯主之

假如表散風邪無別證微嗽者服枳龍圓瀉白散平肺之劑痰涎壅盛玉餅子金星圓下痰熱瀉白散加人參或辰砂半夏圓枳龍圓尤以下後熱不退作驚風之証宜薄荷散服



感寒發熱咳嗽者服惺惺散加麻黃表散寒邪微嗽否參黃人參半夏圓痰嗽半夏茯苓湯

久嗽曾經解利肺氣虛寒者補肺服肺潤肺散肺中風肺受寒久不已灸肺腧九三壯服百部圓陳皮罌粟殼桑根白皮煎湯研化食後服

小兒初生百日内咳嗽肺葉脆弱最難治平常冷熱熱邪入肺中無能得出又不堪吐利必明病源消解風寒化痰順氣益肺生胃胃開氣壯嗽即漸感不可強攻

冷嗽則鼻流清涕面白痰薄日輕夜重或微有邪熱

熱嗽則面微紅鼻乾熱痰稠脈浮數

胃熱不因風寒而得以兒啼便乳壅結心肺不散即氣而達以

玉燕于下

錢氏治嗽之法先實脾胃得實肺則和

小兒咳嗽者膝理受風邪感激臉紅喘促

鼻粘乾黑皆為不治

風邪感 涎生肺受邪 臉紅微帶喘

喉中響似鈴 鼻粘乾紫黑

鼻黑嗽聲連 積聚心中有毒痰 痰感實而并氣逆

此患通身氣不立 食後胃醜言語重 喘急因知病未痊

發汗散風為妙手 順氣消痰絕根源

咳數雖然分冷熱 連聲因肺感風寒 眼赤痰盛喉中響

此水多因汗水乾

小兒咳嗽最難醫

休說名方道喘山

頭痛面青驚風

作發連連不肯休

心肺痛時有膿血

醫士看了也頭愁

此病根源邪在肺

用藥調和得解憂

傷風咳嗽

惡風發熱頭應痛

兩頰微紅鼻涕多

汗出遍身無咳嗽

此傷風證易調和

鼻流清涕肺傷風

寒氣相搏氣不通

壯熱多啼心臍熱

發驚証盛轉加膿

咳嗽氣逆大忌誤用重方云老人小兒熱而腹脹者死

百日嬰兒嗽

涎鳴肺臟虛

喘急心腹脹

哽咽困難居

喘嗽變驚

沾痰作嗽終連綿 喘急時時面臉鮮  
外被客風傷肺穴 內緣冷氣入喉咽  
看着初頸雙眸直 漸漸翻身兩手牽  
口角流涎心腹脹 鴉聲齟齬必難痊

感風氣喘

邪客皮毛肺感風 忽然喘急氣難通  
斜睛汗出唇青逆 猶忌痰涎滯腹中

痰中有血

咳嗽痰中忽有紅 風傷氣血不同  
痰中膿血因頻嗽 肺損聲嘶必引風

咳嗽因風

咳嗽因風肺感寒 痰涎喘急睡難安  
時時發熱心煩燥

臉赤唇紅口鼻乾

鼻內流清涕亦能

咳嗽因風肺受寒

氣生咯血喘多涎

風盛射胎因積起

乳喘無時卧不安

肺亢傷風

肺亢傷風

痰涎嗽喘聲

咳則因有熱

恍惚自然驚

傷暖傷風

傷暖傷風

令兒鼻不通

乳多咽不利

痰聚引驚風

胃冷咳逆

咳逆寒生胃

連聲最損人

衛虛禁不順

牽引痛頻頻肺

冷傳於脾胃諸問曰唐巢氏云風冷傷於肺

喘急喉噴惡候

寒邪傷肺掄

啼哭聲無聲

氣結停胸膈

痰涎喘自驚

驚喘痰壅

驚喘痰潮熱

風驚又食傷

蓋因二種作

發熱體如湯

驚痰雍滯

痰涎壅乳滯胸中

膈節令兒乳不通

咳嗽自然生喘急

精神恍惚變驚風

喉中哽氣

喉中多哽氣

噎飲欲生驚

二證皆癰疾

看看膈搦成

百日内乳噎

此些痰數是尋常

如斯好與肺清涼

大故日久宜作變

須求智者與商量

前篇論說皆

痰候

却問回生不死方

更遇新生百日内 若生此候不相當

### 肺痿

小兒肺痿則寒熱無時咳嗽逆黃膿毒虛言若見頭低咳嗽痰鳴如  
錐鼻塞面黑皆百不治一是為死候

因嗽連綿久 風邪肺受殃 無時寒熱作 咳逆出膿黃  
促喘頭低軟 痰鳴氣胃傷 鼻唇無潤黑 性命在膏肓

### 癰胸

小兒癰胸則因肺臟軟弱 面唇青黃 若見項下沉凹  
陷延如漆日四腿臭苦縮皆為死候不治

胸膈同癰證 喉咽若錐聲 肺因邪濕感 氣喘面唇青

項下深凹陷 延如膠漆頻 口生腥臭惡 舌縮命將傾

咳嗽因風肺受寒 肺停冷血喘生痰 肺言氣喘無他故

喘熱因而目不安

今見喘熱為喘時 下忌酸醃又乳之 痰有肺經傷水殺

及及結聚早求奇

喘給亦是肺熱風 一因發熱氣上衝 初即見為好創病

後來龜背又龜胸 口閉不開延上響 雙目黃時似點燈

此疾終成殘患罕 有奇功斷不從容

歷春

喘促垂蒸痺 痿黃臉脉紅 濤高如鋸齒 手足似枯筒

兩臉虛浮癰 心胃痞不通 魚唇蒼紫黑 靈藥總無功

喘急



華佗云盛而為喘減而為怯故活人亦云發喘者氣有餘也凡  
看文字須要會得本意盛而為喘者非肺氣有餘也氣虛也  
作氣表有餘當誤作不足肺

人參桂實湯 治嬰孩小兒傷寒後氣不和順喘急咳嗽胃弱  
痞塞日夜煩悶神困力乏不思飲食仍治虛痰煩滿頭目昏  
但是傷寒感冷咳嗽不問肺之虛實可汗可溫可下要藥也

桂實四箇上棧米泔浸炒

桑根白皮蜜炙

半夏麴

甘草炙

茯苓上炙

欬父花去梗炒五味子

細辛去葉

阿膠炙炒

麻黃去節

桔梗去蘆炒各五錢

人參去蘆二錢半

右劉散用生薑二片棗一箇去核同煎加烏梅去核少不拘時候服

三和湯

治嬰孩小兒解肺經寒邪止嗽化痰

甘草炙錢

麻黃去節

杏仁去皮尖各二錢

右吹咀用水煎食遠服

潤肺散

治嬰孩小兒寒壅和交肺氣不利咳嗽喘急語聲不出痰涎壅塞胃膈煩滿鼻塞鼻涕咽喉乾痛

貝母去心

杏仁去皮尖炒各二兩二錢半

麻黃去節兩

阿膠炒

桔梗去蘆切各二錢半

人參去蘆七錢

甘草炙五錢

陳皮去白二錢半

右吹咀用水煎食遠服

來就收 治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱頭痛氣喘痰嗽能  
和肺經驚叫癰瘡遍身赤痒往來潮熱時行麻痘痢子餘毒未  
盡止咳嗽化痰

人參 去蘆

茯苓 去皮

桔梗 去蘆炒

半夏 麩

杏仁 去皮尖炒各二錢半

白朮

柴胡 去蘆

知母

貝母 去心麩炒

林黃 去節

甘草 去節生

葶藶 炒

桑根白皮 炒各一錢

秋冬加桂

裏熱加大黃

喘促加馬兜零

發汗用生薑葱同煎不拘時候服

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑湯研化食後服

清肺飲子 治嬰孩小兒解肺經熱化痰止咳

人參去蘆 羌活去蘆 川芎

石膏 赤芍藥 黃芩炒

乾葛 甘草炙 桑根白皮

右剉散用水煎不拘時候服

款花五味子湯 治嬰孩小兒久嗽

款冬花 五味子 麻黃去節

杏仁去皮尖各二錢 甘草炙一錢

右以咀用水煎加馬薤零十五度同煎食遠服

補肺阿膠散 治嬰孩小兒肺胃俱寒氣促咳嗽化痰

人參去蘆 阿膠一匙炒各二錢 馬薤零去皮

杏仁去皮尖 鼠粘子炒 其藥各一錢

糯米五錢

有咳吐用水煎食後服

人參寧肺湯 治嬰孩小兒肺胃俱寒涎喘氣急不得安眠

人參去蘆 五味子 茯苓去皮

白朮 陳皮去白 甘草炙各一錢

右劉散生薑一片 第一箇去核同煎食後服

人參清肺飲 治嬰孩小兒咳嗽寒熱除風痰

人參去蘆 羌活去蘆 五味子

款冬花各二錢 麻黃去節 甘草炙各一錢

右咳咀入桑根白皮一寸 炙同煎不拘時候服

紫香湯

治嬰孩小兒咳嗽聲音不清

紫苑去一

麥門冬去心

款冬花炒

杏仁

去皮尖炒

甘草炙各二錢

右為細末用桑根白皮煎湯入坯子臘脂少許調食遠服

補肺散

治嬰孩小兒咳嗽痰喘氣急

人參去土

白朮

茯苓去皮

甘草炙

麻黃去節

杏仁去皮尖

阿膠炒

訶子煨去核

地骨皮

桑根白皮炙

桔梗去蘆炒

半夏麴

右咬咀用生薑三片煎不拘時候服風熱加防風去蘆又天

麻煨

紫苑膏 治嬰孩小兒咳嗽聲不出

紫苑去土 杏仁去皮尖

右紫苑末同杏仁研入蜜煎如膏如芡實大用蜜味子煎湯研化食遠服

杏蘇飲 治嬰孩小兒痰氣咳嗽不止

杏仁去皮尖炒 紫蘇子炒 陳皮去白

赤茯苓去皮 桑根白皮炒 大腹皮

半夏麴 甘草炙各一錢

右咬咀用生薑一片煎食遠服

七寶散 治嬰孩小兒清肺散熱化痰定喘止咳

大黃麴暴燥 梔子仁 赤茯苓去白

滑石

黃芩炒

芍藥炒

甘草各二錢

右為極細末用桑根白皮煎湯如喘急滿喘不得磨刀水澄  
清溫暖食遠服磨刀水只要常用藥刀去麤石研盆上磨汁  
真珠圓 治嬰孩小兒定喘急鎮驚風痰

天竺黃

天麻煨

牛膽天南星炒

白附子炮

青黛

甘草各二錢

真珠

朱砂水飛各二錢 輕粉半錢

麝香一字

右為極細末煉白蜜圓如芡實大輕粉為衣用竹白竹瀝煎  
湯研化食遠服



元寶湯

治嬰孩小兒咳嗽喘急哮喘連綿不已夜不得睡

薄荷葉

紫蘇

大腹皮

麻黃去節

桂枝

桑根白皮蜜炙

杏仁去皮尖

陳皮去白

甘草炙各一錢

右又咀用生薑三片烏梅半箇同煎食後服

人參半夏圓

治嬰孩小兒脾胃受冷咳嗽氣急胃膈痞滿痰

中呀聲口吐涎沫乳食不下

半夏麴

厚朴薑汁炙丁香

陳皮去白

人參

細辛去葉各半錢

右為極細末生薑汁煮麴糊圓如黍米用生薑湯食後服

百部圓

治嬰孩小兒感冒風寒咳嗽痰熱

百部

蘇黃土節香仁 去皮

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用陳皮去白桑根白皮炙  
罌粟殼去蠶豆同煎研化不拘時候服入松子肉  
去皮五十粒以糖圓分七服

金沸草散

治嬰孩小兒傷風咳嗽涕痰壅熱

金沸草

荆芥穗各三錢 蘇黃去節四錢

前胡

去蘆二錢半 半夏麴一錢半 甘草炙二錢

赤芍藥炒錢半 桑根白皮蜜炙一錢

右以咀用生薑二片煎 鹽水同煎不拘時候服

半夏茯苓湯 治嬰孩小兒咳嗽痰

半夏麴

茯苓去皮

陳皮去白

五味子

葶藶炒

人參

細辛去毒

桑根白皮蜜炙羌活去虛

桔梗去蘆炒

右咬咀用生薑三片煎食遠服

華蓋散

治嬰孩小兒感冒風邪鼻塞聲重語言不出四肢拘

倦咳嗽多痰胃滿氣短

紫蘇子炒

赤茯苓去皮

陳皮去青

桑根白皮蜜炙杏仁去皮尖炒

麻黃去節去心

甘草炙二錢半

右咬咀用水煎不拘時候服以衣被蓋之

甘桔湯

治嬰孩小兒妳下咳嗽

甘草炙

桔梗去蘆炒各二錢

加入參去蘆

葶藶炒各半錢 杏仁去尖去油

右為極細末煉白蜜圓如芡實大每服上令兒服

杏仁膏

治嬰孩小兒久患遠日咳嗽不止

杏仁去皮尖

貝母去心

茯苓去皮各一錢

梔花炒半錢

皂角去皮酥炙一錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用麥門冬去心煎湯研化

食遠服

瀉白散

治嬰孩小兒風熱咳嗽

桑根白皮蜜炙地骨皮

甘草炙

右咬咀加入麥冬蘆麴米一百粒同煎不拘時候服

藕白散 治嬰孩小兒發熱咳嗽嘔吐降氣不能下降  
能上升

五味子

茯苓去皮

青皮去穢

陳皮去

加人參去

右以咀用生薑三片煎合茶送服

瀉白散

治嬰孩小兒風熱痰喘咳嗽

知母

陳皮去

桔梗去穢炒

地骨皮各錢半

桑根白皮蜜炒一兩

甘草炙

青皮去穢炒

黃芩炒各錢

右以咀用水煎食遠服

寧肺散

治嬰孩小兒咳嗽無問新久

麻黃五錢

瞿麥散 去毒蓋炒一兩

甘草炙錢半

石為極細末用烏梅一箇去核煎湯調化臨睡服

薄荷散

治嬰孩小兒熱極生風痰盛

薄荷葉五錢

羌活去蘆

麻黃去節

全蠍去毒炒

甘草炙各半錢 天竺黃

僵蠶去毒炒

白附子炮各一錢 加竹瀝少許

右為極細末用薄荷煎湯調化不拘時候服

金犀圓

治嬰孩小兒驚風痰盛風熱

鬱金二錢

半夏麴

雄黃水飛各半錢

蝎稍去毒炒

天南星 去毒炮各一錢

附子一角

已豆去心皮酥酒七角

右為極細末醋洗麝香同煎如蒸米大用生薑薄荷同煎湯食

煎子 治嬰孩小兒食不調嘔吐泄瀉痢疾胃腸滿悶痰

喘咳嗽腹中癰疾

天南星去毒炮錢半夏去毒薑汁浸七次十二箇

白附子炮

滑石各半錢

小兒用半錢尾炒二箇

輕粉一角

巴豆去心膜末黃連二錢七箇

右為極細末黃糯米糊圓如芥子大用生薑湯食煎服

玉餅子

治嬰孩小兒風痰驚積咳嗽驚風

天南星去毒炮二錢半

全蝎去毒尾炒二箇

滑石

白附子 炮各半錢 輕粉一兩

巴豆 去心 酥油水 炙過三灰

右為極細末 煮麴糊圓如黍米 大用半匙 煮湯吞服

餅子 治嬰孩小兒驚風痰癇

天南星 薑汁製半夏 去膽薑汁製槐花餅各五錢

桔梗 去蘆炒五錢 甘草炙二錢 白礬一錢

右為極細末 薑汁桑根白皮同煮麴糊圓如黍米 大用半匙

煎湯食遠服 傷寒痰嗽曰麥煎散服

杏象膏 治嬰孩小兒傷風咳嗽

杏仁 去皮尖七箇 人參去蘆 甘草炙

貝母 去心 五味子 阿膠炒



蘇黃去節各一錢

石為極細末煉白蜜圓如芡實大用白湯研化食後服

辰砂半夏圓 治嬰孩小兒肺癰痰壅咳嗽喘促胃弱疳積  
悶咳嗽不利呀呷有聲

五靈脂水飛去沙石炒

杏仁去尖

葶藶炒各半錢 半夏麴一錢

右為極細末生薑汁煮麴圓如黍米大米砂為衣用生薑  
煎湯食遠服

金花散 治嬰孩小兒因解脫風寒傷肺咳嗽

麝香半錢

防風去蘂

半夏去麴各分

皂角一皮

巴豆去皮膜油上筒

右以水一升銀器內入巴豆皂角黃乾餘三味同為極細末用薄荷蜜煎湯調化食前服

人參欬花膏 治嬰孩小兒肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎壅逆惡心腹脹滿腹脊疼痛虛弱冷嗽連年近日

人參去蘆

欬花去梗炒 五味子

紫苑去上

桑根白皮去皮各二錢

右為極細末煉白蜜攤圓如芡實大用牛黃煎湯研化不拘時候服

人參欬花膏 治證同前

人參去蘆

欬花去梗炒 五味子各八錢

紫苑去上

桑根白皮去皮炒各二兩

加杏仁去皮尖炒錢

木香

檳榔去脂

紫蘇葉各五錢

桔梗去蘆炒

貝母去心各二錢半

馬兜零二錢

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑煎湯研化食後服

人參軟花膏 治證問前

人參去蘆

款各花去梗炒 五味子

紫苑去土

桑根白皮炒各二錢半

知母

貝母去心

白礬煨

麻黃去節

訶子煨去核

陳皮

細辛各錢半

半夏麴半錢

罌粟殼去毒盡炙二錢

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑煎湯研化食後服

無價散

治嬰孩小兒風熱喘促悶亂不安俗言謂之馬脾風

辰砂水飛三錢半輕粉一兩

甘遂麝香各二錢半

右爲極細末每服一字用藥水少許上酒調小點抄藥在上沉下去却凝灌之

愈風餅子

治嬰孩小兒咳嗽驚痰風熱

天南星去毒炮白礬煨

半夏麩

猪牙皂條土子熱金各一錢

大黃紙煨二錢

右爲極細末

和餅用生薑煎湯研化食前服

定喘如神散

治嬰孩小兒咳嗽風痰喘促不安

罌粟殼去心可盡蜜炙黃二兩

細辛去葉

人參去芦

五味子

款冬花去梗

紫苑去土

桑根白皮 蜜炙各二兩

杏仁 去皮尖炒一兩

知母七錢

右為極細末用生薑汁一斗五升糖一箇去核同煎湯調化不拘

時候服

金杏膏

治患咳嗽及百日咳嗽

凡患咳嗽者宜服此膏

此膏零去皮

百日咳者服

右為極細末用生薑汁一斗五升糖一箇去核同煎湯調化在於唇上服

百日咳者服

凡患咳嗽者宜服此膏

右為極細末用生薑汁一斗五升糖一箇去核同煎湯調化在於唇上服

傷寒

傷寒之病，初起之時，身熱惡寒，無汗，脈浮，此太陽經受邪也。

若邪氣入裏，則身熱惡寒，汗自出，脈洪大，此陽明經受邪也。

若邪氣入少陰，則身熱惡寒，汗自出，脈沉細，此少陰經受邪也。

若邪氣入太陰，則身熱惡寒，汗自出，脈沉滑，此太陰經受邪也。

若邪氣入厥陰，則身熱惡寒，汗自出，脈沉微，此厥陰經受邪也。

若邪氣入三陽，則身熱惡寒，汗自出，脈浮大，此三陽經受邪也。

若邪氣入三陰，則身熱惡寒，汗自出，脈沉微，此三陰經受邪也。

若邪氣入五臟，則身熱惡寒，汗自出，脈沉微，此五臟受邪也。

若邪氣入六腑，則身熱惡寒，汗自出，脈沉微，此六腑受邪也。

神方齊集

辨證

應象大論云春傷於風夏生痼泄夏傷於暑秋生痼疾秋傷於濕冬生咳嗽冬傷於寒春必病溫

口熱

口中醋氣

妳辨不消

腹中疼痛

小兒嬰孩必辨虎口三關脈紋紅紫而長一指三部左手入迎緊盛斷之再驗小便赤白可知表熱有無大便秘可知裏熱輕重裏實四順飲微下

論小兒傷寒與時氣同

小兒傷寒得之與大人無異所異治者蕪驚而已又多因夾食而得傷寒論云治法與大人一般但小兒剽悍性溫涼爾仲景云人受寒溫之氣即發者為傷寒其寒毒藏於肌膚之間至春

而發者為溫者至夏而發者為熱病又以為氣溫者氣寒者氣  
冷秋氣熱為之時氣萬全云熱病傷寒溫病時氣傳變無異也  
凡時氣者四時之間有不正之氣也為春應暖而反寒夏應熱  
而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫此其時而有其氣其氣  
傷人則頭疼壯氣咳嗽氣鬱煩渴心煩身熱傳變與傷寒  
無異俗呼謂天行者是也治法亦同傷寒實證云時氣歌云但  
作傷寒病治之

驗陰陽二脈

凡陰陽二脈自不同陽脈者微脈去數熱若陰脈則不數熱  
四肢逆冷身寒脈微而細大小便滑洩又一法陽脈手掌中心  
溫熱陰脈其冷



驗表裏兩證俱見

傷寒表證當汗裏證當下不易之法也發表攻裏本自不同吐  
瀉神丹不可合飲桂枝承氣安可並進假令病人脉浮而大是  
表證當汗其人發熱煩渴小便赤却當下此皆表裏俱見五苓  
散主之假令傷寒不大便六七日頭痛有熱者是裏證當下其  
人小便清者知不在裏仍在表當須發汗此是兩證俱見即未  
可下宜與桂枝湯假令病人心下滿口燥不欲食六便堅脉沉  
細是裏證當下頭痛汗出微惡寒手足冷却當汗此兩證俱見  
者仲景所謂半在表半在裏是也小柴胡湯主之假令太陽病  
表裏未除而醫數下之遂協熱而利不止心下痞硬仲景謂  
之表裏不解桂枝人參湯主之假令本太陽病醫反下之因而

腹痛是有表復有裏仲景用桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃又云太陽病桂枝證醫反下之利不止脉促者表未解喘而汗出者葛根黃連湯主之

已上仲景治傷寒有表復有裏之法學者當意推之

凡治傷寒須辯表裏表裏不分汗下差誤古人曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡

孫真人曰汗下相反其害甚速如魚出水若蛾入湯傷寒有表證有表證有半在表半在裏有表裏兩證俱見有無表裏證在表宜汗在裏宜下半在表半在裏宜和解表裏俱見兩證參詳無表裏證大柴胡湯下之

傷寒正受

是陽藥治法與大人一同但用藥溫涼藥所謂七十二證  
證其證無越張長沙宋奉議格例不過小小分別用藥中病  
即止惡寒者必假人藏身引衣庇身飲熱飲酒類亦至惡寒  
身多涼是為表證宜微汗溫解表之劑解肌湯諸氏去麻黃  
敗毒散惡熱而內實者必出頭露舌揚手擲足掀衣氣熱煩  
躁是為裏證宜躁利至若頭額冷手足厥口氣冷面色青  
淡人便自利或瀉青此則陰病裏虛當用溫藥救裏理中湯四  
君子湯加木香丁香陳皮生薑棗等開去按同前不拘時候服  
有虛熱參苓白朮散辨證之法幻見嬰孩必辨虎口二關脈紋  
紅色長而重稚一指三部左手人迎脈盛斷之再驗小便赤白  
可知表熱之有無大便秘利可知裏熱之輕重所謂熱之虛實

傷寒表裏汗下溫之法鳳麟經云小兒傷寒止有正受夾驚夾  
食三證

其證有陰盛發燥陰證似陽學者當以脈別之諸數爲熱  
諸遲爲寒無如此最驗也小兒有證陰者即變爲慢驚今  
列陰證庶要識之

傷寒正受夾驚夾食

正受傷寒所由感受寒邪胃冷腹痛者傷於腠理輕則傷風重則  
壯熱頭痛鼻塞流涕斯乃正傷寒候又有傷風傷暑者傷於筋濕  
皆能作熱困乏但不咳嗽又有夾驚因驚之時而又傷寒故云  
夾驚傷寒又有因食之時而感受寒邪故曰夾食大抵傷寒或  
有它證似積之類切不可妄下若下之六早表裏俱虛難以調

連謂之塲證大人尤尚可藥小兒壞證救濟無門或云傷寒有驚候亦不可下驚藥雖是夾驚證亦不可用驚藥如傷寒只可表解雖曰用表不可令兒汗出如王氏薄苛散人參羌活散之類若執在裏證語鄭聲於證當下者只用散末藥洗心散四順飲之類不可用以圓子或以取積藥下之其熱不去反成無辜夾食者於理用下宜緊圓子下之量其虛實而用須究問先傷寒後夾食或夾食後傷寒夾食乃在於食時之間雖母覺知其先後多是不覺若知其理以後受者而先調理既已不明其先後即可表解以俟裏證有者方可與下尤爲善也且下與表二理不可併行有乎得失且如家寶云二日前在表二日後在裏斯乃大槩約而言之恐後人傳之不當反爲其害凡傷寒

在表即解在裏即下不可以日限爲拘其或有在表裏之間亦宜和解和解又不愈俟傳裏下爲最良者雖語小兒煩喘切不可急急取愈且在用心明究表裏若也審察表裏用藥不當吁哉

巢氏病源曰小兒傷寒候傷寒者久時發熱而人月觸之寒氣入腠理搏於血氣則發潮熱頭痛體疼鼻塞流涕謂之傷寒又春時應暖而反寒此非其時而有其氣發初謂之時行傷寒小兒不能冒觸寒氣而病傷寒者多因乳母解脫衣服不避風寒故也夏秋之間天氣盛熱乳母抱持當風取涼致風寒之氣傷之是以亦病傷寒也其華驚者是熱乘心心主血脈小兒心動爲熱所乘故發驚其大便不通者是寒搏於氣而生熱驚

流入大腸故燥澀而不通也其咳嗽者邪至於肺肺主氣傷寒邪氣先客皮膚隨氣而入故救重者有膿血之其自汗者陽虛受邪陰氣又虛邪氣又乘於陰陰陽俱虛不能制其津液所以汗出也其潮熱往來者是邪氣與正氣交爭正氣勝則邪氣散故潮熱退若邪氣未盡則餘熱往來不止其嘔者是胃氣虛熱乘虛入胃胃得熱則氣逆故嘔逆其渴者是熱入臟腑得熱則津液竭燥故渴也其鼻衄者是熱持於氣而垂於血血得熱則流散故從鼻出也大凡小兒傷寒治法問歲以定熱輕者服惺惺散問歲已後急須表汗次當發散然後調理須在一晝夜得熱退方保無虞今之醫士多不表汗致令五六日熱不除入於經絡搏於血氣傳變多證或生驚風漸至危篤傷生等命可不

真乎合先投解肌湯一二服汗透而熱漸輕次用人參羌活散  
熱退汗多服人參黃耆湯調理如無汗可隨證用藥庶無差誤  
矣

傷寒癰腫同異

傷寒身體重而黃女而赤喘急煩躁口中心氣熱可久煩悶煩急  
也癰腫則腮赤燥多煩躁悸動昏倦四肢冰冷傷寒當發散治癰  
行溫平有大熱者解毒

論六經所受表裏虛實

表證 屬陽 病在六腑 小腸大腸膀胱胃二焦

陽病外證脈 浮 洪 數

其證壯熱煩渴大小便秘澀頭面有汗昏憤氣麤接手挪



足三陽乃足三陽自頭至足

太陽屬膀胱

其證腰脊強頭項痛發熱惡寒乃陽證之裏

陽明屬胃

其證自痛身執鼻塞不惡寒反惡熱自汗不寐內實大便  
難乃陽證之裏

少陽屬膽

其證胸膈痛口苦咽乾目眩往來寒熱而嘔病在三陽二

陰之間

表證

發熱惡寒頭痛惡風惡寒或身體痠痛小便清

脈

浮洪

浮緊

浮數

表虛脈 浮而緩

其證自汗惡風小便自利

明理論曰汗出而惡風為表虛當解肌

參蘇飲 人參羌活散 香蘇散加葛根

惺惺散 解肌湯 小柴胡湯加防風白朮

表實脈 浮而緊

其證無汗而惡大熱小便赤澀

明理論曰無汗而惡寒為表實當發汗

解肌湯 麻黃桂枝湯加黃芩 蕭氏青龍湯

惺惺散 加麻黃人參敗毒散

論下

活人書曰表病裏和汗之則愈下之則死

楊氏曰陽證體輕脈輕而浮於外在腑爲表表有邪則知陽虛而陰威發表之藥宜溫抑陰助陽也

湯氏曰小兒發熱之初急須表汗次當發散然後調理  
在一晝夜執退爲佳今之醫士多不用麻黃但用惺惺散  
人參羌活散之類此乃常法致令失表三五日熱不除入  
於經絡搏於血氣表裏受邪內外蘊熱變證蜂起或作驚  
風或成痘證恐有別證傷生之命此皆失表之過也

當汗而不汗

仁齋曰則汗血化爲毒血則熱悶眩悶昏迷譫語心忪氣  
短發燥喘滿小便多皆血證也

當汗而誤下

明理論曰表未解而醫反下之胃中空虛陽氣內陷則爲  
懷懷

楊氏曰誤下則內泄其真氣邪氣得以深入爲痞滿爲結  
實爲懊憹爲衄血

張氏曰承氣入胃陰盛乃亡乃陰盛出外而誤投承氣下  
之外得寒而助邪內受虛而損正安得不亡述之爲妄下  
之戒

裏證

屬陰

病在五臟

心肝脾肺腎命門

陰病外證脈

沉而微

其證厥冷自利煩燥無身熱頭痛

太陰屬脾

其證腹滿或痛手足溫自利不渴咽乾腹滿時痛有積

少陰屬腎

其證口燥舌乾而渴惡寒欲寐不寐見光明咽乾口燥  
胃汁乾也

厥陰屬肝

其證唇青煩滿消渴身重不欲食舌卷囊縮毒入腎也

裏證 不惡寒反惡熱手足心液下有汗口燥胃乾身熱腹滿  
小便如常大便堅硬

脉滑實弦緊中間數盛此裏證也

裏實脉沉而實

其證心腹滿身熱口氣熱大便堅

明理論曰腹脹滿而短氣者尤在裏法當下之

四順膏  
飲  
解肌湯  
惺惺散  
加煨大黃

裏虛而傳陰證

脈沉微細

其證自利厥冷身清冷四逆口氣冷煩燥而無身熱發青

舌黑或白胎或卷強頭額冷手冷溫面色黯淡瀉青

明理論曰腹脹滿而短氣者裏邪虛也且溫之

仁齋曰陰病裏虛常用溫熱藥救裏

理中湯  
溫裏  
甘草乾薑湯  
厥冷管脾散

四君子湯  
加乾薑  
薑加附子  
去皮  
鹽  
大  
炮

論汗溫

活人書曰裏病表和下之則愈汗之則死

仁齋曰裏病體重脈重而不浮其病在裏  
有邪則爲陰虛而陽盛是以攻裏之藥性宜寒而  
九

又曰陰病亦謂之裏陰經受邪則成臟病裏者胃腑之主  
而臟受病又深於裏矣又當助陽以救裏法當溫之是以  
溫陰之藥性宜助陽抑陰也

當下而失下

楊氏曰致血氣不通是以熱淫欲泄厥者手足冷也陰盛  
則厥其脉滑數指爪時溫

當下而誤汗

楊氏曰外泄其正氣內邪盛虛而出譫語爲亡陽動經下厥上竭至於陽厥似陰

楊氏曰桂枝下咽陽盛則斃正恐陽盛而入誤以桂枝發汗內得熱以助邪外受虛而損正安得不斃述之爲誤汗戒

審驗汗下

千金云陽盛陰虛汗出即死下之當愈陽虛陰盛下之即死汗之即愈身熱增寒汗出陽虛宜汗身熱潮熱汗出陰虛宜下

調經論云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒以此別之



不汗強汗 津液枯竭而死

合汗不汗 竅閉悶絕而死

不下強下 洞洩不禁而死

合下不下 脹腫煩亂而死

右件當審今的當行之

可汗病證

惡寒者不當風而憎寒惡風者當風而憎寒皆屬表

龐氏云大法春宜汗秋宜下

發熱惡寒身體痛而脈浮凡傷寒發表須當隨輕重而汗有發汗者有和解者兼四時發汗亦自不同春不可大發汗以陽氣尚弱可用小柴胡湯之類冬不可發汗者以陽氣伏藏不問傷

寒中風並數用桂枝麻黃各半湯或得少汗而解或無汗自解  
病勢甚者不拘比夏月天氣大熱而脈洪大宜正發汗不可用  
麻黃桂枝熱性藥須是桂枝麻黃湯加黃芩石膏知母升麻夏  
月有桂枝麻黃證不加黃芩輩服之轉助熱氣便發斑大陰脈  
浮少陰脈微熱亦須發汗

三陰經皆不可汗

陽經云汗不出不至足者死熱病得汗大熱不去  
者死

### 不可汗證

脈虛不轉失氣是腹中動氣也大便秘小便數大便堅小便少  
未可攻之恐津液還入胃必先硬後瀉也小便如常乃可攻之

滑問其小便利否曰幾行若本小便日三四行今已罷行故大便不  
久出今爲小便數少以津液當還入胃故大便不久必通也  
已上證候皆不可下

王氏云陽寒有承氣之戒又問轉藥孰緊答曰大承氣湯最緊  
小承氣湯者次之大柴胡湯又次之仲景治法湯條孰積  
用湯液不可用圓了

下後忌補

孫真人云服大承氣湯得利差忌不可服補藥熱氣得補復成  
使下之是重困也

可水不可水

脈沉數細無多痰少脈微虛煩腹間有動氣血壞病已發汗

吐下不解爲壞病

可下病證

不惡寒反惡熱手掌心并腋下濺濺汗出胃中乾燥糞結聚潮熱大便硬小便如常腹滿而喘或譫語脈浮而滑或心胃連臍腹大段注悶腹中痛坐臥不安胃悶喘急極者不候他證使下之凡大便秘妨悶恐尚有表證者亦須少少飲小承氣湯微解之不可過多令大洩也若失下則氣血不通四肢便厥醫士不識反疑是陰厥後進熱藥禍如反掌不可不察

已上證候皆可下

不可下證

陽明病自汗若發汗小便自利不可下宜蜜湯法通脈浮惡寒

凡病人非大渴不可與冷水若小渴口燥咽乾小小呷滋潤之  
若大渴煩燥能飲一升者可與半升隨力量多少但減一半若  
不與則無由作汗乾燥煩喘而死者多矣但莫令足意飲也若  
大汗將來燥渴甚者足意飲之勿疑常見人因渴飲水而得汗  
見小渴遂強與之致停飲心下滿結喘而死者亦多矣其熱脈  
數尚可作汗而解者出於幸也

可吐不可吐

胃脘痞滿痰壅寒凝脈浮或滑並宜瓜蒂散吐之虛人當吐不  
敢吐宜枳實散壓氣毒痰水過則毒入胃乃可微吐

枳實散枳實炒石為極細末每服半錢用米飲調化食遠服

斑毒

斑毒有二證有溫毒發斑有熱毒發斑溫毒發斑者因冬月觸  
冒寒毒之氣至春始發熱毒發斑者因夏月觸冒暑毒發汗已  
經汗下熱即發大抵斑毒四時感於乖戾之氣或亦發汗熱毒  
不散表虛裏實血溢不行故遍身發出斑疹及癰疹如錦紋巢  
氏云發斑不可用表藥

犀角地黃湯 治嬰孩小兒傷寒及痘病應發汗而不解內有  
瘀血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血上便黑者此方消化瘀血  
兼治瘡癰出得大盛

赤芍藥三分 地黃生二兩 牡丹皮二兩

犀角一兩

右咬咀用水煎食後服

葛根橘皮湯 治嬰孩小兒冬寒未即病至春發至夏得熱其寒解冬溫始發肌肉壯爛悶但嘔清汁者

葛根

橘皮

杏仁

去皮尖炒

知母

黃芩

麻黃

甘草炙各五錢

右咬咀用水煎不拘時候服

黑膏子 治嬰孩小兒初春病人肌肉發熱癰瘡如錦紋咳嗽心悶但嘔者此名瘟毒也

地黃生四兩

豉半升

右二味以猪膏一斤合研絞汁用麝香雄黃少許調化不拘

時候服毒便從皮膚中出則愈惡毒入

大青四物湯 治嬰孩小兒傷寒熱病 日已上發汗吐下後

熱不除身上斑出

大青一兩

阿膠炒二錢半

甘草炙五錢

豉一兩

右以咀用酒煎食前服

陽毒傷寒者蓋言陽氣勝而為毒審其脈浮大而之數身重頭  
疼面赤有斑斑如錦紋狂言見鬼咽乾腫痛下痢膿血五日可  
治七日不可治

陽毒升麻湯 治嬰孩小兒陽毒一二日便成陽毒或吐下之

後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言狂走或下痢或見鬼



脉浮大數發斑如錦紋咽嗑痛下膿血

升麻

犀角

射干

黃芩

人參去蘆

甘草炙去心

右咬咀用水煎食遠服溫覆手足汗出則解未愈再服

龍膽散

治嬰孩小兒傷寒陽毒毒氣在臟狂言妄語亂走

草龍膽

鐵粉二兩

右爲極細末用磨刀水調化食遠服小兒多有此病

發黃

夫發黃皆由寒溫之氣結結在於脾胃蒸發而成也陽明病無汗小便不利心中熱壅必發黃凡發黃其寸口無脉鼻氣冷並不可治巢氏云凡發黃而下痢心腹滿者必死診其脉沉細者

亦死又有百日半歲小兒非傷寒瘟病而身微黃者亦是脾胃  
熱忌不可灸也多灸之則熱甚此是將息過度所為微瀉而反數  
與除熱粉散粉之目歇不得妄與湯藥及灸

茵陳湯 治嬰孩小兒陽明病發熱汗出者此為熱越不能發  
黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴欲飲水者此為  
瘀熱在裏必發黃傷寒七八日身黃如橘色小便不利腹滿

茵陳

梔子去殼

大黃

右以咀用水煎食前服小便當自利尿如皂莢汁吐色正赤  
一宿腹減黃隨小便中出也

梔子蘗皮湯 治嬰孩小兒傷寒身黃發熱

梔子去殼五箇甘草二兩

黃蘗二兩

右吹咀用水煎食後服

連翹赤小豆湯 治嬰兒小兒傷寒發熱

麻黃去毒

連翹

甘草炙

生薑

赤小豆

梓皮生卷二兩

杏仁 去尖大四十箇

棗 去核二箇

右吹咀用水煎食後服生小兒發熱搗汁服

粉散

白朮

茯苓

川芎

白芷

右為搗細末每一兩入米粉三兩

粉撲周身止汗若汗

已出盡後則服之汗出多亡陽遂

風煩燥不得眠也

又方治忽發者宜用此須臾費不貲服此汁和蜜同調服

### 正受傷寒證

感證傷寒熱 惡寒發熱時 目紅而煩赤 毛髮起稀疎  
鼻塞并多涕 呵氣臭不醫 若冬時即冷 傷寒更莫疑  
傷寒壯熱胃邪攻 煩燥煩煩面紅 本是先傳心與肺  
急須解利忌寒涼

### 傷風寒證

明理論曰惡寒者不待風而寒身雖大熱而不去反至於向火  
覆被惡風者雖不當風自然寒也

傷寒無汗惡寒者 緊瀉浮沉 在裏者 自汗惡風脈浮緩

面光不慘是傷風

傷寒之候有多般

一器

詳便

百病

氣藏身熱是傷寒

傷寒最害

猶須細審詳

若言煩表汗

十日見幸張

但尚良藥

鮮脫必生黃

滿口瘡難救

都緣純是陽

初得渾身熱

多端無喜悅

眼急似驚風

涼胃莫令熱

和無輕清劑

四肢汗自發

鼻塞腦受寒

咳嗽喘不安

臉赤類發熱

面青口舌乾

然感發狂語

微利調氣痊

表裏皆因冷熱

渾身壯熱

如緋

便冷良炎累作渴

便於畏冷渴類稀

此為二證

重

細視心時鼻耳脾

用藥憑虛無與實

若令錯誤免

險危

傷寒初得渾身熱

惡寒多喘不

快

只看眼急似驚風

却被醫士道急熱 切須涼胃莫令渴 渴時飲水無休歇  
只將表藥和解服 四肢便輕汗自發

傷寒病證

單傷寒夾驚傷寒火食傷寒二候發冷二同今有明證妙訣如  
單傷寒者渾身壯熱鼻流清涕身上寒毛起咳嗽欲喘

夾驚傷寒證

小兒先受驚後感傷寒先發汗後利驚

其狀驚啼咬乳痰壅脚冷怔忡面紅 熱時發驚惕手足  
抽掣夾驚傷寒之候

解表 人參羌活散 惺惺散如麻黃湯 即後利驚

頭赤身多熱 心煩又畏寒 唇紅微有渴 驚哭睡難安

頭熱脚稍冷 驚風氣不和 漸生証氣急 夢裏搐來過  
愛眠肺受觸 嗽盛有涎多 急宜藍麝散 旦治莫蹉跎  
小兒壯熱積驚涎 喘喘身煩不穩眠 頰赤口乾脾胃熱  
心風氣盛發狂言

頭燒脚冷氣傷和 氣急仍無愛睡多 夢裏發驚渾似搐  
更加喘甚有涎過 若翻便汗方能差 急解消痰去久痼  
汗出定驚全退熱 要須子細急醫他

夾食傷寒證

小兒先停積滯後解陽寒

其證身熱頭痛頭顙肚腹熱盛惡風氣急滑利眼堆膿面  
黃寒熱如瘡目胞腫脹痛夜熱晝涼或吐瀉利肚硬下糞

酸臭夾食傷寒之候

脉氣口緊盛 解表 惺惺散如麻黃 後取積漸調胃氣

頭痛并腹疼 嘔逆又噤煎 臟腑腥酸臭 蒸蒸熱不眠

有積通身熱 陰陽氣失節 面上斑紅點 開口時加渴

先表方知藥有功 次取如神真妙訣 用藥微利兩三行

調和脾胃方喜悅

鼻涕頭疼時吐逆 面黃紅白變不一 此因夾食又傷寒

發表有功方下積

有積通身先自熱 那更傷寒來相接 面上紅斑赤似丹

開口時時加燥渴 先表方知藥有功 次取已爲神妙訣

用藥微微與取通 臟腑安和自然悅



渾身壯熱被風傷 早冷微微晚似湯 如此者居二三日

頭疼煩燥汗如漿 鼻中清涕流涓涓 咳嗽頻頻口內癢

臟腑夾食宜先下 次須解得汗出良

單受傷寒證

此證前多困倦 身熱惡寒皮膚 鼻內流清涕 頭疼咳嗽喘急

八般傷寒證

鼻涕流 非時肌熱無休 喘鳴吐水并聲重

證有由

傷寒候 鼻塞下泄厥赤黃 喘急咽內毒微痛

鼻中清涕時時出 傷風咳嗽聲由及

氣脫身上寒毛起 小便如粉面如粧

傷寒咳嗽證

肺青準

咳嗽聲相連

胃中陽毒積

延潮夜連咳

胃高并壯大

汗閉氣不宣

逆食多

都緣有

解表除咳嗽

疎風斷根源

唇青鼻紫咳都連

積聚心中養毒延

夜嗽胃高兼肚大

身乾汗閉氣無宣

更加逆食諸言重

理嗽應當不解痊

表汗除風候此治

定教表邪早安歇

大抵傷寒不可重下亦不可重下併行則成壞證

風可表傷食宜下慎勿因之咳嗽宜早治

夾風傷寒證

孩兒傷寒又夾風

身多痰涎

太極陰戶微午而

口水如涎滴滿口

傷寒變為麻子候

小兒痘子候偏多 嗽喘涎漸以久痾 發熱驚風無怕物  
看熱眼定目光多 喉中似響如刺刺 那等相連并連和  
及至發熱如急搐 唇紅臉赤脉交羅 心煩渴水口頭熱  
且脉如水髮以黑 舌上有瘡如粟米 定知二日熱來壓  
此病便如麻子候 莫將良藥與教多 便須用毒解為妙  
便與調和氣勿過

傷寒變為痘子候

未前五日臉唇青 一見生入慢便驚 暴地冒前如赤瘰  
漸同桃李箇般形 齒牙有血風多臭 指甲無紅似白銀

會得醫時容易好 不能却道熱氣表 脾藥與之凉心臟  
痘自消而不動情 未效變之成大患 不須占卜鬼和神

傷寒瘵子候

未先五日顛如寒 不覺生驚久怕癇 心下有如棋李樣  
眠睛青黑面紅鮮 手心如火髮毛豎 睡裏時開狂亂言  
手撥嫌人多悶燥 又兼喘急氣相關 一周此是風癇候  
二三歲為瘵子看 切忌不須通臟腑 只將圓散表心間  
涎開瘵子生如血 七日之間便自安

傷寒驚狂

身熱發狂顛 臉赤唇紅目又鮮 氣促生涎多渴燥  
睛睛卒口不曾眠

傷寒鼻衄

傷寒何鼻衄 蓋為熱傳心 合汗應無汗 陽邪氣最深

結胃傷寒

大結胃兮小結胃 因熱寒熱不雷同 陽經下早留為毒

用藥無非直達攻

痞似結胃

證同前證應無痛 病在陰經下早虛 邪毒結留心下滿

此名痞氣

傷寒伏熱候

傷寒伏熱脉慢遲 不用調理速次醫 須汗遍身後煩熱

咽喉痛燥不相宜 急須涼藥投心肺 方用通腸取轉機

傷寒結胃惡候

傷寒因下早 腫痛結胃間 痞悶時喘喘 皮膚作紫斑

傷寒結胃死候

氣短面唇青 心間痛不停 胃前浮紫腫 背脊冷如水  
手足尋不穩 睛中赤血筋 鼻腮連耳黑 克絕在逡巡

傷寒伏毒傳臟腑不治

傷寒未解脉微浮 裏毒欲出無蹤由 外邪伏入臟腑內  
致令下痢血堪愁 片生黑血寸腸斷 醫士一見便須憂  
妙藥莫調心肺臟

傷寒惡候

小兒傷寒面色黑 耳內痛聲無吃意 嘔吐泄瀉氣交橫

大腸小腸乾痛泄 眼生淚 溼翳漫漫 性命歸其空喘息

傷寒死候

目白如星火 長吁氣若刀 鼻連眉下黑 燥喘似癰狂

唇烈乾焦縮 舌重發紫黑 傷寒有如此 不必細尋方

傷寒或已發未發死候

項軟聲沉 羊睛血脈 正心黑腫 長吁如湯 鼻竅焦黑

喘促狂燥 指脾衄血 辰星乾縮 舌生血瘡 手足攣攣

交人定睛 大小便絕 腹中乾響 外腎紫縮 渴水齒齦

傷寒變作死候

面黑目白如火赤乾欬塞噎 舌生瘡如白腐唇青黑縮

大熱煩躁多渴目睛附 面如土色口吐白沫通身熱如火

面如緋色或口鼻上下如蘭煩喘卧不着席外腎黑縮  
項強反張胃前青黑色無啗大氣出如湯渾身忽熱如湯  
有欬同白痰縮四肢冷身上汗如雨

忽瀉下黑血及如魚腸腥臭

大小便不利肚脹如鼓服諸藥不通

忽身上腫起如惡風毒氣既延如膠

手足心主中瘡大熱不退口禁涎流

喘促塞噎諸身如水時伏身山氣

口開不收舌縮手足指甲青黑色

小兒傷寒可醫

鼻內清水是傷寒 汗出是傷寒

鼻塞是傷寒



面赤是傷寒

吐白沫是傷寒

兩眼黃赤是傷寒

小便黃赤是傷寒

小兒傷寒不可醫

傷寒面黑者不治

傷寒大小腸痛不治

傷寒忽作鴉聲不治

傷寒吐熱者不治

傷寒囊黑不治

傷寒爪甲黑不治

右件其傷寒皆是邪氣傷於臟腑滯氣其血氣則寒熱血脈  
亂不能飲食其頭痛面赤者則是陽毒其面青不語多笑身  
寒是為陰毒凡傷寒二日前且汗二日後宜轉又云陰毒且  
迴陽陽毒宜解散轉亦此說二日前汗二日後轉此大畧之  
言爾

全幼心鑑卷之二